

# Биология-9

Шифр 42444466  
Предмет Биология  
Класс 9  
ID профиля 956830

## Задание ID1 (Задача № 1281308)

У растений выделяются несколько типов почек в соответствии с их ритмом развития и функциями, в том числе – спящие почки, длительное время находящиеся в состоянии покоя.



Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

### Ответ ученика


- ✓ Спящие почки способны ветвиться
- ✗ Спящие почки характерны для лиственных деревьев, кустарников и многолетних трав
- ✓ Спящие почки могут НЕ развиваться в течение всей жизни растения
- ✗ Спящие почки ежегодно нарастают и величина годичного прироста равна толщине годичного кольца ксилемы
- ✓ Спящие почки могут быть пазушными и придаточными
- ✗ Спящие почки могут быть только вегетативными


Время ответа: 19.03.2022 10:04:34

Баллы: 2 из 3

## Задание ID2 (Задача № 1281310)

На рисунке показан поперечный срез стебля (А) и проводящий пучок (Б) рдеста (*Potamogeton sp.*).





Основываясь на анатомических особенностях растения, укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- Аэренихима состоит из клеток с крупными выростами
- В аэренихиме располагаются клетки механической ткани – астросклереиды
- Проводящие пучки концентрические амфивазальные
- В проводящих пучках редуцирована флоэма
- Данное растение – гидрофит
- Для растения характерна атактостела

Время ответа: 19.03.2022 10:06:05

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID3 (Задача № 1281315)

На фотографиях представлены участки срезов проводящей ткани высшего растения (*Embryophyta*).




Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Через структуры, обозначенные цифрами 1-2, соединяются протопласты соседних клеток
- Цифрами 1-2 обозначены окаймленные поры, цифрой 3 – простая пора
- Раствор по проводящим элементам, показанным на фотографиях, может передвигаться как от корней к листьям, так и в обратном направлении
- На рисунке показаны наиболее совершенные проводящие элементы цветковых растений (*Magnoliophyta*), по которым вода перемещается с наибольшей скоростью
- На фотографиях показаны сосуды, проводящая ткань – ксилема
- У цветковых растений (*Magnoliophyta*) НЕ встречаются проводящие элементы подобные тем, что показаны на рисунке

**Задание ID7 (Задача № 1281342)**

Перед вами схема строения клетки некого эукариотического организма.




Для каждого из следующих утверждений о данном организме укажите, является оно верным или неверным:


Ответ ученика

- Данный организм способен питаться только автотрофно
- Данный организм принадлежит к супергруппе SAR
- Предок данного организма получил свой хлоропласт в результате вторичного эндосимбиогенеза
- В хлоропласте данного организма в значительном количестве присутствует хлорофилл b
- Данный организм обладает изоконтным жгутиковым аппаратом
- Органелла под цифрой 17 содержит запас питательного вещества

**Задание ID8 (Задача № 1281346)**

Этот странный небольшой организм был впервые обнаружен в конце XIX века на стенах морского аквариума, и лишь недавно удалось найти свидетельства его присутствия в дикой природе.





Для каждого из следующих утверждений о данном организме укажите, является оно верным или неверным:

#### Ответ ученика

- Фибрillлярные клетки имеют мезодермальное происхождение
- Данный организм ведёт пелагический образ жизни
- Данный организм относится к типу Пластинчатые (Placozoa), включающему всего несколько видов
- Данный организм обладает полостным пищеварением  
Основная функция секреторных клеток, расположенных только по краю тела – продукция пищеварительных
- ферментов, а липофильные клетки, расположенные на вентральной стороне, выделяют нейропептиды, регулирующие поведение организма
- Данный организм перемещается, в основном за счёт работы таких белков как динеин и тубулин

Время ответа: 19.03.2022 10:10:55

Баллы: 2 из 3

#### Задание ID9 (Задача № 1281349)

В 2007 году у побережья Филиппин на глубине около 2500 м при помощи дистанционно-управляемой субmaries «ROV Global Explorer» было обнаружено необычное животное, длиной до 9 см, издалека напоминающее кальмара и названное исследователями «squidworm» («кальмарочервь»), или по-научному - *Teuthidodrilus samoae*.





Для каждого из следующих утверждений о данном организме укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- Данный организм имеет планктонную личинку – трохофору
- Данный организм можно отнести к животным, обладающим вторичнорогостью
- Сходство данного организма с кальмаром является результатом близкого эволюционного родства
- Данный организм принадлежит к группе (подклассу) малощетинковые кольчатые черви» (Oligochaeta)
- У данного организма редуцированы пальпы и перистомиум
- Данный организм имеет нервную систему в виде брюшной нервной цепочки

Время ответа: 19.03.2022 10:12:05

Баллы: 3 из 3

### Задание ID13 (Задача № 1281451)

Одним из наиболее радикальных хирургических вмешательств для лечения крайне тяжелой (морбидной) степени ожирения является шунтирование желудка с формированием гастроэзоноанастомоза по Roux. На первом этапе в ходе операции с помощью стеллерного аппарата желудок (stomach) разделяют, в результате чего создается небольшой желудочный карман (pouch). На втором этапе операции тонкая кишка (small intestine) разделяется на две части. Тощую кишку вводят вверх и формируют анастомоз (соусьтье) с желудочным карманом. Двенадцатиперстная кишка после этого присоединяется к новой кишечной ветке. Таким образом, пищевой комок попадает из пищевода (esophagus) в желудочный карман, и далее сразу в тощую кишку, минуя дистальный отдел желудка и двенадцатиперстную кишку.



Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Желудочный карман необходим для адекватного расщепления белков в данной зоне
- Пищевой комок подвергается действию желудочного сока и желчи путем поступления пищи ретроградно в тело желудка
- Операция абсолютно безопасна и никогда не сопровождается никакими хирургическими осложнениями  
При избыточном потреблении пищи после операции может развиться демпинг-синдром (синдром,


- ✓ возникающий вследствие ускоренного перемещения содеримого желудка в кишечник без надлежащего переваривания), который чаще всего проявляется стойкой брадикардией и психомоторным возбуждением
- ✓ В результате операции нарушается всасывание витамина B12, калия, железа
- ✓ В результате операции нарушается эффективное всасывание углеводов, витаминов D и A, натрия

Время ответа: 19.03.2022 10:15:23

Баллы: 2 из 3

### Задание ID14 (Задача № 1281452)

На приём к врачу обратился мужчина с жалобами на прогрессирующую в течение дня мышечную утомляемость. По результатам рентгенографии органов грудной клетки (А) выявлено новообразование средостения (пространства грудной клетки между двумя плевральными полостями) с неровными контурами. По данным компьютерной томографии (В, С) заподозрена злокачественная опухоль тимуса — инвазивная тимома; отмечено врастание в перикард (с наличием жидкости в перикарде) и клетчатку средостения. Известно, что у около четверти пациентов с тимомой диагностируют аутоиммунное заболевание миастения гравис, которое развивается вследствие избыточной продукции Т-лимфоцитами антител к эпиполипам клеток эпителиальной тимомы, имеющим схожую структуру с субъединицами ацетилхолинового рецептора.



Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✗ При условии хирургического удаления тимомы можно ожидать исчезновение симптомов миастении
- ✓ При сдавливании опухолью верхней полой вены будет отмечено набухание и расширение вен на шее, руках и грудной стенке
- ✗ При лечении глюкокортикоидами мышечная утомляемость станет более выраженной
- ✓ После умеренной физической нагрузки у пациента можно отметить миоз (сужение зрачка), энофтальм (запавшее положение глазного яблока) и урежение сердцебиения
- ✗ Массивное накопление жидкости в перикарде проявляется выраженным снижением артериального давления
- ✓ Для тимомы характерен местно-распространенный процесс с прорастанием в органы средостения, легкие и плевру

Время ответа: 19.03.2022 10:18:20

Баллы: 1.5 из 3

## Задание ID15 (Задача № 1281456)

Газообмен между альвеолами и легочными капиллярами приводит к повышению концентрации кислорода и снижению концентрации углекислого газа в малом круге кровообращения. Далее кровь поступает в магистральные артерии большого круга, где исследователю возможно осуществить измерение газового состава плазмы крови (а точнее, парциальный давлений газов –  $pO_2$ ,  $pCO_2$ ). Более низкие значения парциального давления свидетельствуют о меньшем объеме растворенного соответствующего газа.

Представьте, что из кровотока одномоментно были элиминированы все эритроциты, при этом легкие функционируют нормально, и сразу после этого произведено измерение газового состава крови.

Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- Артериальное  $pO_2$  не изменится
- Общее содержание углекислого газа в артериальной крови не изменится
- В дальнейшем, клетки организма испытывают тяжелую гипоксию вследствие недостаточности растворенного в крови кислорода
- Артериальное  $pCO_2$  не изменится
- Клетки организма испытывают тяжелую гипоксию вследствие резкого, одномоментного с элиминацией эритроцитов, падения  $pO_2$  в плазме
- Ни  $pCO_2$ , ни общее содержание углекислого газа в артериальной крови не изменится


Время ответа: 19.03.2022 10:21:50

Баллы: 1.5 из 3

## Задание ID34 (Задача № 1281514)

На фотографиях ниже показаны структуры, относящиеся к генеративной сфере высших растений (*Embryophyta*):





После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список характеристик объекта (список избыточен – в нем есть лишние характеристики).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список групп растений (список избыточен - в нем есть лишние названия групп).

**Соотнесите характеристики из списка с соответствующими им объектами на каждой из фотографии, а также с названиями групп растений, для которых они характерны.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика





Время ответа: 19.03.2022 10:27:33

Баллы: 5 из 5

### Задание ID36 (Задача № 1281519)

Ниже приведены фотографии различных насекомых:





После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список систематических групп (отряды или подотряды) насекомых (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список типов ротовых аппаратов (список избыточен – в нем есть лишние названия).

**Загляните в глаза этим удивительным созданием и соотнесите «портреты» насекомых (*Insecta*) с систематическими группами, к которым они относятся и типами имеющихся у них ротовых аппаратов.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



I) Блохи (Siphonaptera)


J) Стрекозы (Odonata)

VIII) Хватательный (типа «маска»)

Время ответа: 19.03.2022 10:30:06

Баллы: 4.5 из 5

## Задание ID38 (Задача № 1281526)



После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список названий костей (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список названий мышц (список избыточен – в нем есть лишние названия).

**Определите название каждой из костей и соотнесите её с конкретной мышцей, которая к ней прикрепляется, из предложенного списка.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетягните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика





Время ответа: 19.03.2022 10:34:36

Баллы: 4.5 из 5

### Задание ID45 (Задача № 1281545)


Формирование специфических частей цветка (тычинок, плодолистиков, листочков простого околоцветника, либо чашелистиков и лепестков) из листоподобных зачатков во флоральной меристеме регулируется генами идентичности органов цветка. Упрощенно их работу можно представить в виде схемы, получившей название ABC-модель. Графически она показана на рисунке ниже.



Согласно этой упрощенной схеме, если активны лишь гены A, то формируются чашелистики, а там, где гены A и гены B работают совместно – лепестки. Там, где экспрессируются гены B и C, – развиваются тычинки, а если гены C действуют самостоятельно, то плодолистики.

Ответьте на следующие подвопросы:

- 1) Какие гены согласно ABC-модели активны при формировании различных частей цветка тюльпана (*Tulipa*);
- 2) Какое строение будут иметь цветки у двойных мутантов с выключенными генами A и B? Какое строение будут иметь цветки у двойных мутантов с выключенными генами A и C? (Известно, что гены A и C - антагонисты, то есть при инактивации одного из этих генов другой «занимает» его место);
- 3) Какой цветок сформируется, если инактивированы все три гена – A, B и C?
- 4) На рисунке 1 показан нормально развитый цветок резуховидки Таля (*Arabidopsis thaliana*) модельного растения, принадлежащего к семейству Крестоцветные (Brassicaceae), а на рисунках 2 и 3 – цветки мутантов того же вида растений (при определении частей растения важно учесть, что на чашелистниках резуховидки трихомы простые, а на листьях разветвленные). Предположите, каковы особенности формирования цветков у растений-мутантов с позиции модели развития цветка;
- 5) На рисунке 4 представлены фотография и схема цветка тропического растения *Lacandonia brasiliiana* (Triuridaceae). На схеме красным цветом обозначены тычинки, желтым – пестики, лпо – листочки простого околоветвника. Какие отклонения от стандартной ABC-модели развития наблюдаются при формировании цветка у этого растения?



При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!

Ответ ученика

1. Гены развития \*лепестков\* (A+B)  
Гены развития тычинок (B+C)  
Гены развития плодолистиков (C)
- 2.1. Такие цветки будут состоять только из плодолистиков  
2.2. Цветок не будет развиваться, а разовьётся, например, в почку, либо побег дегенерирует.  
3. Цветок не будет развиваться, а разовьётся, например, в почку, либо данный генеративный побег дегенерирует.
4. Случай 2. Возникла мутация в генах группы В, и неразвились тычинки и лепестки. Вместо лепестков развелся ещё 1 круг чашелистиков.
4. Случай 3. Возникли мутации в генах групп А и С, либо А, В и С. На листочках разветвленные трихомы, а не пристые, как у чашелистиков.
5. За развитие плодолистиков отвечают гены А и В, а за развитие тычинок - только гены А. То есть в ABC-системе переменились местами тычинки и плодолистики.

Время ответа: 19.03.2022 11:13:20

Баллы: 3.5 из 10


### Задание ID47 (Задача № 1281547)

В 1907 году французский военный врач Шарль Луи Альфонс Лаверан был удостоен Нобелевской премии за описание возбудителя одного опасного инфекционного заболевания, а пятью годами ранее премия была вручена британцу Рональду Россу, работа которого была посвящена описанию жизненного цикла того же возбудителя. На приведённой в центре иллюстрации из «Encyclopaedia Britannica» издания 1911 года, изображён этот

жизненный цикл. Буквой «п» обозначены ядра.



Шарль Л. А.  
Лаверан  
(1845 – 1922)



Рональд Росс  
(1857 – 1932)

Ответьте на следующие подвопросы:

- 1) Чей это жизненный цикл? Возбудителем какого инфекционного заболевания является данный организм?
- 2) Каково систематическое положение данного организма? Укажите домен, «царство», супергруппу и тип (отдел), к которым он относится;
- 3) Какие стадии развития паразита проходят внутри организма человека? Есть ли у него другие хозяева? Если да – то какие и является ли человек в таком случае окончательным или промежуточным хозяином? Ответ на последний вопрос аргументируйте;
- 4) В каких клетках хозяина проходит мерогония (развитие паразита, на стадиях, отмеченных цифрами I-VI)? В каких ещё клетках она может проходить? Каким образом паразит проникает в клетки хозяина?
- 5) Как можно охарактеризовать данный жизненный цикл с точки зрения соотношения стадий, имеющих разное число наборов хромосом? В какой момент цикла происходит мейоз? Какая стадия соответствует формированию мужских гамет?
- 6) Предложите не более пяти различных способов противодействия распространению данного организма. Это могут быть способы, широко используемые сейчас или же потенциально применимые в будущем.

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

Ответ ученика


- 1.Маллярийный плазмодий (Plasmodium), вызывает малярию.
2. Cellulata, Archea, Eukariota, Diaphoretica, TSAR, SAR, Chromalveolata, Alveolata, Apicomplexa, Coccidia, Plasmodium.
- 3.Спорозоиды(из слюны комара), мерозоиты, гаметоциты. кроме человека (промежуточный хозяин) в комарах рода Anophelis (окончательный хозяин), в котором происходит половое размножение.
- 4.На рисунке показано, что в эритроците, но изначально это происходит в гепатоцитах. Проникает в клетки с помощью апикального комплекса (коноид, роптрии, микронемы), образующего поразитофорную вакуоль, в которой живет споровик.
- 5.Гаплофазный жизненный цикл с зиготической редукцией. Мейоз происходит на начальных стадиях спорогонии. Стадия Xa соответствует отпочковыванию мужских гамет, их формированию - VI, VIIa, VIIIa, IXa и Xa.
6. От камаров: отравляющие в-ва, противомоскитные сетки, нефевание водоемов, наездники, гамбузии. От людей: кремация трупов. От споровика: полынь, хинин

Время ответа: 19.03.2022 12:00:17

Баллы: 10 из 10

## Задание ID4 (Задача № 1281333)

На рисунке показан поперечный срез одного из видоизменённых растительных органов.



Для каждого утверждения укажите, является оно верным или неверным для данного органа:

Ответ ученика


- ✓ Под цифрой 5 показана перидерма
- ✗ Это поперечный срез корневища
- ✗ Основная функция данного органа – поглощение воды из почвы
- ✗ Этот орган часто встречается у растений, обитающих на заболоченной почве
- ✓ Под цифрой 2 показана первичная ксилема
- ✓ Данный орган принадлежит двудольному растению


Время ответа: 19.03.2022 13:07:56

Баллы: 3 из 3

## Задание ID5 (Задача № 1281337)

На схеме показаны варианты развития мужского гаметофита (пыльцевого зерна) у цветковых растений. Начальная стадия (А) – микроспора.





Проанализировав схему, укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✓ Структуры под цифрой 2 являются гаплоидными
- ✓ Трёхклеточное пыльцевое зерно прорастает на стадии 3
- ✓ Под цифрой 3 показана спермиогенная клетка
- ✗ Под цифрой 2 показаны сперматозоиды
- ✗ При прорастании пыльцевого зерна спермиогенная клетка образует пыльцевую трубку
- ✓ Структура под цифрой 1 является гаплоидной

Время ответа: 19.03.2022 13:09:30

Баллы: 3 из 3

### Задание ID6 (Задача № 1281341)

На молекулярно-филогенетическом дереве цветковых растений (по Stevens, P.F., [www.mobot.org](http://www.mobot.org)) голубым цветом отмечены порядки, в которые входят растения-источники синей краски: вайда красильная (*Isatis tinctoria* L.) и индигофера красильная (*Indigofera tinctoria* L.).



Обозначения:

monocots – однодольные;

eudicots – высшие двудольные;

magnoliids – магнолииды или примитивные двудольные;

commelinids – коммелиниды;

rosids – розиды;

asterids – астериды;

rosidI/Fabidae – фабиды;

rosidII/Malvidae – мальвиды;

asteridI – астериды I;

asteridII – астериды II;

Проанализируйте дерево и укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Вайда является двудольным растением, а индигофера – однодольным растением
- Вайда и индигофера имеют спайнолепестный венчик
- Если объединить порядки *Fabales* и *Brassicaceles*, то вместе они образуют монофилетическую группу
- Индигофера входит в группу rosidI/Fabidae
- Вайда входит в группу commelinids
- Цветок индигоферы является зигоморфным

Время ответа: 19.03.2022 13:11:06

Баллы: 3 из 3

## Задание ID10 (Задача № 1281351)

Известно, что у растительноядных млекопитающих пищеварительная система, в частности её отдельные органы, очень сложно устроены. Перед вами на фото представлена внутренняя поверхность одного из отделов такого органа.



Проанализируйте представленное фото и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✖ Из отдела «сычуг» пища попадает сразу в слепую кишку
- ✓ Это внутренняя поверхность рубца, который и является истинным желудком у жвачных парнокопытных
- Многокамерный желудок является эволюционным приспособлением для переваривания клетчатки и
- ✖ свойственен отрядам Зайцеобразные (Lagomorpha), Парнокопытные (Artiodactyla), Непарнокопытные (Perissodactyla)
- Движение пищи в многокамерном желудке осуществляется в последовательности: рубец – книжка –
- ✓ повторное пережёвывание – сетка – сырчуг
- ✓ Многокамерный желудок домашней коровы состоит из 4-х камер
- ✓ У новорождённого телёнка размер рубца по отношению к другим отделам увеличивается с возрастом

Время ответа: 19.03.2022 13:12:37

Баллы: 2 из 3

---

### Задание ID11 (Задача № 1281355)

---

Известно, что у растительноядных млекопитающих пищеварительная система, в частности её отдельные органы, очень сложно устроены. Перед вами на фото представлена внутренняя поверхность одного из отделов такого органа.



Проанализируйте представленное фото и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✖ Это внутренняя поверхность отдела «сетка», из которого происходит отрыгивание пищи для повторного пережёвывания
- ✖ Рубец, сетка и книжка имеют общее название “преджелудок”
- Многокамерный желудок является эволюционным приспособлением для синтеза незаменимых аминокислот
- ✖ и свойственен отрядам Зайцеобразные (Lagomorpha), Парнокопытные (Artiodactyla), Непарнокопытные (Perissodactyla)
- ✖ Из отдела «сычуг» пища попадает обратно в пищевод на повторное пережёвывание
- ✓ Самым большим отделом многокамерного желудка у взрослых жвачных является рубец
- ✓ Это внутренняя поверхность отдела “книжка”

Время ответа: 19.03.2022 13:14:19

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID12 (Задача № 1281358)

Известно, что строение определённого органа напрямую связано с его функцией. Перед вами на рисунке схематично изображён один из органов позвоночных.



Проанализируйте рисунок и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Многокамерный желудок свойственен НЕ всем травоядным
- Многокамерный желудок домашней лошади состоит из 4-х камер
- Это матка крупного рогатого скота
- Этот орган состоит из 4-х камер
- Входное и выходное отверстия закрываются при помощи сфинкторов, регулируемых вегетативной нервной системой
- Это полый мышечный орган


Время ответа: 19.03.2022 13:14:47

Баллы: 3 из 3

## Задание ID16 (Задача № 1281460)

Баббл-тест – это высокочувствительный метод ультразвуковой диагностики сброса крови справо-налево (из малого круга кровообращения в большой, минуя микроциркуляторное русло). В кровеносные сосуды вводят смесь физиологического раствора NaCl с пузырьками воздуха, взбитую в шприце, далее производят регистрацию потока микропузырьков в сердце или в сосудах головного мозга методом ультразвука. К самым частым право-левым кровеносным шuntам относят открытое овальное окно и легочные шунты.

## в диагностике право-левых шунтов



Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

### Ответ ученика

- ✓ Целесообразно производить инъекцию смеси микропузырьков в периферические вены
- ✗ Диаметр микропузырьков должен превышать диаметр капилляров
- ✓ Если пузырьки регистрируются в сосудах головного мозга, то испытуемому не рекомендуется заниматься глубоководным погружением
- ✗ Микропузырьковый сигнал при наличии легочных шунтов регистрируется раньше, чем при наличии открытого овального окна
- ✓ Открытое овальное окно в большинстве случаев относится к врожденным порокам сердца
- ✓ Легочные право-левые шунты являются физиологическими шунтами и имеют важное функциональное значение

Время ответа: 19.03.2022 13:17:46

Баллы: 1.5 из 3

## Задание ID17 (Задача № 1281463)

Иван-Царевич устроил международный конкурс красоты для лягушек и жаб, чтобы найти среди них заколдованную Царевну. В финал вышло 5 красивых, но ядовитых претенденток:

Амазонская двухцветная лягушка (*Phyllomedusa bicolor*)



**ДЕРМОФИН**  
Агонист мю-опиоидных рецепторов

Аргентинская песочная жаба (*Rhinella arenarum*)



**АРЕНОБУФАГИН**  
Блокатор  $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -насоса

Эквадорская трехцветная лягушка (*Epipedobates anthonyi*)



**ЭПИБАТИДИН**  
Неселективный агонист ацетилхолиновых рецепторов

Колорадская речная жаба (*Incilius alvarius*)



**БУФОТЕНИН**  
Агонист серотониновых рецепторов

Колумбийская золотая лягушка (*Phylllobates terribilis*)



**БАТРАХОТОКСИН**  
Ингибитор инактивации потенциал-зависимых  $\text{Na}^+$ -каналов

Царевич знал, что целовать ядовитых лягушек и жаб очень опасно, но забыл, какие признаки отравления могут появиться после общения с каждой из претенденток. Помогите Царевичу вспомнить их. Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Батрахотоксин вызывает эйфорию, манию, диарею, дрожание конечностей
- Эпигбатидин вызывает сердечные аритмии, диарею, галлюцинации
- Дерморфин вызывает центральную остановку дыхания, сужение зрачков и запоры
- Аренобуфагин может потенциально использоваться для уничтожения раковых клеток
- Дерморфин может потенциально использоваться как обезболивающее средство
- Буфотенин вызывает эйфорию, манию, диарею, дрожание конечностей

Время ответа: 19.03.2022 13:21:02

Баллы: 2 из 3

### Задание ID18 (Задача № 1281464)

Женский менструальный цикл – это сложный физиологический процесс, состоящий из синхронизированных циклических изменений в промежуточном головном мозге, яичниках, матке:



Соответственно, отсутствие менструаций (аменорея) может быть вызвано патологией промежуточного мозга, яичников или матки. Для выяснения причины аменореи производят функциональные пробы: с изолированным введением прогестерона, либо с последовательным введением эстрогена и прогестерона. Гормоны вводятся в организм извне, но с физиологическими дозировками и длительностью.

Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Отсутствие менструации после изолированного введения прогестерона указывает на стойкое отсутствие овуляции зрелого фолликула
- При атрезии (недоразвитии) фолликула введение прогестерона приведет к скучным менструациям из-за гипоэстрогении
- Наступление менструации при последовательном введении эстрогена и прогестерона может возникать при выраженной эстрогеновой недостаточности
- Отсутствие менструации при последовательном введении эстрогена и прогестерона может возникать при

- ▼ патологии эндометрия матки
- ✖ Появление менструации после эстроген-прогестероновой пробы при низком уровне ФСГ указывает на патологию яичников
- ✓ Избыточная продукция прогестерона при сохранной продукции эстрогена – это фактор риска злокачественной пролиферации клеток эндометрия

Время ответа: 19.03.2022 13:24:28

Баллы: 1.5 из 3

## Задание ID35 (Задача № 1281515)

В ходе эволюции у многих цветковых растений сформировались приспособления для взаимодействия с определённым типом опылителя.

Ниже приведены фотографии различных растений:



После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список опылителей (список избыточен – в нем есть лишние типы опылителей).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список приспособлений цветка (список избыточен – в нем есть лишние характеристики).

**Рассмотрите фотографии цветков или соцветий и соотнесите их с основным характерным для них типом опылителя и приспособлениями для привлечения этого опылителя.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетягните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика




Время ответа: 19.03.2022 14:51:29

Баллы: 5 из 5

### Задание ID37 (Задача № 1281523)

Ниже приведены изображения некоторых представителей отрядов класса Aves:





**5**

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список названий систематических групп (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список характеристик отрядов (список избыточен – в нем есть лишние характеристики).

**Используя данные о морфологии, экологии и систематики, соотнесите изображение с названием отряда и подходящей для него характеристикой.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



обычно представляющее собой ямку в песке, либо  
прямо на голые скалы

IX) Рулевые перья не развиты. Гнездо в большинстве случаев, представляет собой плавающую кучу из растительных остатков. Рыбоядные

X) В качестве представителей данного отряда можно отметить ястреба-тетеревятника, скопу, орла-могильника


Время ответа: 19.03.2022 13:34:57

Баллы: 4 из 5


### Задание ID39 (Задача № 1281528)

По данным ВОЗ, инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к некрозу нервной ткани) — вторая по частоте причина смерти после ишемической болезни сердца. Первостепенной задачей врача является скорейшее установление причины инсульта для определения тактики лечения. На рисунках ниже изображена модель кровообращения тканей головного мозга:


1



2




3



4



5



После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список типов ишемического инсульта (список избыточен - в нем есть лишние элементы).

В среднем столбце указаны номера рисунков (сами рисунки приведены выше).


В правом столбце приведен список основных факторов риска (список избыточен - в нем есть лишние элементы).

**Установите тип ишемического инсульта и основной фактор риска его развития по картине расположения очагов ишемии, их контуру и размеру, а также по состоянию кровеносного русла.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетягните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



Время ответа: 19.03.2022 13:48:10

Баллы: 1.5 из 5

### Задание ID46 (Задача № 1281546)

На фотографиях показано ценное культурное растение подсолнечник однолетний (*Helianthus annuus L.*). Его масличные сорта используют для получения масла, а грызовые сорта – в пищу.





Изучите фотографии и ответьте на следующие подвопросы:

- 1) К какому семейству относится подсолнечник?
- 2) Назовите тип соцветия подсолнечника?
- 3) Какие типы цветков можно обнаружить в соцветии подсолнечника?
- 4) Какова роль каждого типа цветка в соцветии?
- 5) Как называется плод подсолнечника?
- 6) Охарактеризуйте плод подсолнечника по числу семян, сочности околоплодника и способности к вскрыванию.

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

Ответ ученика

1. Сложноцветные (астровые).
- 2.Корзинка.
- 3.Трубчатые, ложноязычковые.
- 4.Трубчатые - фертильные, образуют семена.  
Ложноязычковые - стерильные, превлекают опылителей.
- 5.Семянка.
- 6.Односемянный сухой невскрывающийся плод.

Время ответа: 19.03.2022 15:00:20


Баллы: 10 из 10

---

### Задание ID48 (Задача № 1281548)

---

Перед вами позвоночный столб лесной куницы (А- вид сверху; Б – вид сбоку; В – конец позвоночного столба).





Используя свои знания систематики и морфологии (остеологии), дайте ответы на следующие подвопросы. При ответе используйте не только теоретические знания, но и данное фото.

- 1) Сколько отделов позвоночника должно выделяться теоретически у представителя данного вида и сколько вы видите реально. Если имеются отсутствующие отделы или, наоборот, лишние, укажите, что это за отделы;
- 2) По строению каких отделов можно точно сказать, что данный позвоночный столб не может принадлежать классу Птицы (Aves)?
- 3) Можно ли утверждать, что у позвонков различных отделов остистые отростки несколько отличаются формой и степенью развития? Укажите функцию этих отростков в целом и конкретно в позвонках грудного отдела;
- 4) Какие, на ваш взгляд, морфологические изменения могли бы произойти в позвоночнике (и позвонках), если бы вдруг лесная куница перешла полностью к водному образу жизни по аналогии с современными представителями китообразных?

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

---

Ответ ученика

- 1.Должно быть 5, видно 3 (не видны крестцовый и хвостовой отделы).
- 2.На первой фотографии видно, что у атланта 2 мышечка, а у птиц 1. Все позвонки платицельные, а у птиц гетероцельные.
- 3.Да, например это помогает при определении отделов позвоночника: у грудных остистые отростки смотрят назад, а у поясничных - вверх.
4. Позвонки увеличелись бы в размерах и по массе. В них стало бы больше отверстий. Редукция крестцового отдела.

Время ответа: 19.03.2022 14:18:40

Баллы: 2 из 10

---