


# Биология-11

Шифр 42443474  
Предмет Биология  
Класс 11  
ID профиля 972767

## Задание ID2 (Задача № 1281311)

На рисунке показан поперечный срез стебля (А) и проводящего пучка (Б) рдеста (*Potamogeton sp.*).



Основываясь на анатомических особенностях растения, укажите для каждого из следующих утверждений, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Данное растение – мезофит
- В аэренохиме располагаются клетки механической ткани – брахисклереиды
- Для растения характерна эустела
- Проводящие пучки биколлатеральные открытые
- Аэренохима состоит из клеток паренхимной формы
- В проводящих пучках редуцирована флоэма


Время ответа: 19.03.2022 10:04:21

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID3 (Задача № 1281315)

На фотографиях представлены участки срезов проводящей ткани высшего растения (*Embryophyta*).





Ответ ученика


- Через структуры, обозначенные цифрами 1-2, соединяются протопласти соседних клеток
- Цифрами 1-2 обозначены окаймленные поры, цифрой 3 – простая пора
- Раствор по проводящим элементам, показанным на фотографиях, может передвигаться как от корней к листьям, так и в обратном направлении
- На рисунке показаны наиболее совершенные проводящие элементы цветковых растений (*Magnoliophyta*), по которым вода перемещается с наибольшей скоростью
- На фотографиях показаны сосуды, проводящая ткань – ксилема
- У цветковых растений (*Magnoliophyta*) НЕ встречаются проводящие элементы подобные тем, что показаны на рисунке

Время ответа: 19.03.2022 11:45:25

Баллы: 1 из 3

### Задание ID7 (Задача № 1281342)

Перед вами схема строения клетки некого эукариотического организма.



For each of the following statements about the organism shown in the diagram, indicate whether it is true or false:

Ответ ученика


- Данный организм способен питаться только автотрофно
- Данный организм принадлежит к супергруппе SAR
- Предок данного организма получил свой хлоропласт в результате вторичного эндосимбиогенеза
- В хлоропласте данного организма в значительном количестве присутствует хлорофилл b
- Данный организм обладает изоконтным жгутиковым аппаратом
- Органелла под цифрой 17 содержит запас питательного вещества

Время ответа: 19.03.2022 10:08:27

Баллы: 0.5 из 3

### Задание ID8 (Задача № 1281347)

Этот странный небольшой организм был впервые обнаружен в конце XIX века на стенах морского аквариума, и лишь недавно удалось найти свидетельства его присутствия в дикой природе.



Для каждого из следующих утверждений о данном организме укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Данный организм перемещается в основном за счёт работы таких белков как миозин и актин
- Данный организм имеет протонефридию в качестве органов выделения
- Данный организм относится к типу Пластинчатые (Placozoa), включающему всего несколько видов
- Данный организм питается в основном путем фагоцитоза оседающих на его поверхность пищевых частиц  
Основная функция секреторных клеток, расположенных только по краю тела – продукция пищеварительных
- ферментов, а липофильные клетки, расположенные на вентральной стороне, выделяют нейропептиды, регулирующие поведение организма
- Данный организм имеет диплофазный жизненный цикл с гаметической редукцией

Время ответа: 19.03.2022 10:10:06

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID9 (Задача № 1281348)

В 2007 году у побережья Филиппин на глубине около 2500 м при помощи дистанционно-управляемой субмарины «ROV Global Explorer» было обнаружено необычное животное, длиной до 9 см, издалека напоминающее кальмара и названное исследователями «squidworm» («кальмарочервь»), или по-научному - *Teuthidodrilus samoae*.



Для каждого из следующих утверждений о данном организме укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Данный организм периодически линяет, сбрасывая старую кутикулу
- Данный организм ведёт бентосный образ жизни
- Сходство данного организма с кальмарами может служить примером Мюллеровской мимикрии, при которой ряд ядовитых (несъедобных) видов имеют сходные ярко выраженные фенотипические признаки
- Данный организм принадлежит к группе (подклассу) малощетинковые кольчатые черви» (Oligochaeta)
- Данный организм обладает вторичной полостью тела
- Данный организм обладает параподиями


Время ответа: 19.03.2022 10:12:06

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID14 (Задача № 1281453)

На приём к врачу обратился мужчина с жалобами на прогрессирующую в течение дня мышечную утомляемость. По результатам рентгенографии органов грудной клетки (А) выявлено новообразование средостения (пространства грудной клетки между двумя плевральными полостями) с неровными контурами. По данным компьютерной томографии (В, С) заподозрена злокачественная опухоль тимуса — инвазивная тимома; отмечено врастание в перикард (с наличием жидкости в перикарде) и клетчатку средостения. Известно, что у около четверти пациентов с тимомой диагностируют аутоиммунное заболевание миастения гравис, которое развивается вследствие избыточной продукции Т-лимфоцитами антител к эпилептикам клеток эпителиальной тимомы, имеющим схожую структуру с субъединицами ацетилхолинового рецептора.





Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- При сдавливании опухолью верхней полой вены будет отмечено набухание и расширение вен на животе и ногах
- При лечении глюкокортикоидами мышечная утомляемость станет менее выраженной
- Для тимомы характерен местно-распространенный процесс с прорастанием в органы средостения, легкие и плевру
- После умеренной физической нагрузки у пациента можно отметить птоз (непроизвольное опущение верхнего века) и снижение силы рукопожатия
- При условии хирургического удаления тимомы можно ожидать исчезновение симптомов миастении
- Массивное накопление жидкости в перикарде проявляется выраженным повышением артериального давления

Время ответа: 19.03.2022 10:17:22

Баллы: 1 из 3

### Задание ID15 (Задача № 1281457)

Газообмен между альвеолами и легочными капиллярами приводит к повышению концентрации кислорода и снижению концентрации углекислого газа в малом круге кровообращения. Далее кровь поступает в магистральные артерии большого круга, где исследователю возможно осуществить измерение газового состава плазмы крови (а точнее, парциальный давлений газов –  $pO_2$ ,  $pCO_2$ ). Более низкие значения парциального давления свидетельствуют о меньшем объеме растворенного соответствующего газа.

Представьте, что из кровотока одномоментно были элиминированы все эритроциты, при этом легкие функционируют нормально, и сразу после этого произведено измерение газового состава крови.

Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- В дальнейшем, клетки организма испытывают тяжелую гипоксию вследствие недостаточности растворенного в крови кислорода
- Артериальное  $pO_2$  не изменится
- Общее содержание кислорода в артериальной крови не изменится
- Артериальное  $pCO_2$  не изменится
- Клетки организма испытывают тяжелую гипоксию вследствие резкого, одномоментного с элиминацией эритроцитов, падения  $pO_2$  в плазме


- ✓ Общее содержание углекислого газа в артериальной крови не изменится

Время ответа: 19.03.2022 10:19:25

Баллы: 1 из 3

### Задание ID19 (Задача № 1281469)

Некоторым людям кажется, что биохимия – очень сложная наука, потому что ее изучение требует запоминания множества соединений. В частности, согласно *E. coli* Metabolome Database метаболом кишечной палочки (*Escherichia coli*) содержит как минимум 3755 малых молекул. Однако подобная позиция совершенно не верна! Дело в том, что многие биомолекулы синтезируются путем объединения относительно небольшого количества типовых звеньев, словно живые организмы играют в химический конструктор. На практике знание основных блоков метаболизма, а также способов их соединения позволяет достаточно уверенно ориентироваться в многообразии биологических веществ. На рисунке представлена одна из молекул, которая в больших количествах присутствует в цитоплазме микобактерий (*Mycobacterium*), в том числе – Палочки Коха (*Mycobacterium tuberculosis*), опаснейшего возбудителя туберкулеза. Мы выделили четыре ее фрагмента черным цветом (учтите, что некоторые атомы и связи остались обозначены серым). Обратите внимание, что фрагменты 2 и 3 пересекаются.



Внимательно рассмотрите рисунок, после чего выберите, какие утверждения являются верными, а какие – неверными:

Ответ ученика

- ✓ Представленное соединение включает в свой состав остаток маннозы
- ✗ Представленное соединение включает остаток аминокислоты цистеина, которая не является протеиногенной, поскольку находится в D-конфигурации
- ✓ Фрагмент 3 может быть обнаружен в муреине
- ✓ В представленном соединении присутствует  $\beta$ -O-гликозидная связь
- ✓ В представленном соединении присутствует N-гликозидная связь с аминокислотой
- ✗ Фрагмент 4 может быть обнаружен в липидах

Время ответа: 19.03.2022 11:57:24

Баллы: 1 из 3

### Задание ID20 (Задача № 1281472)

Одним из наиболее изучаемых явлений в современной науке является регулируемая клеточная смерть, поскольку она лежит в основе многих физиологических и патологических процессов. На рисунке изображены упрощенные события, которые связаны с тем, как клетки инициируют свою гибель. Обратите внимание на то, что далеко не все последовательные события соединены стрелками на схеме – мы предлагаем вам разобраться в их связи самостоятельно.


В рамке 1 вы можете видеть, как активность некоторых белков зависит от состояния остатков цистеина в их составе.

Рамка 2 изображает две реакции, которые способен катализировать цитозольный фермент XDH в одной из своих форм (мы умышленно не указываем соответствие форма/реакция).

Рамка 3 иллюстрирует конверсию формы 1 XDH в форму 2 под действием протеазы XDH-XO-P, в норме локализованной в митохондриях.

Cas – ферменты каспазы (протеазы); proCas – их неактивные формы; CTS – ферменты катепсины (мощные неспецифические протеазы); CAPN – протеазы кальпанины; СytC – цитохром c; МРТР – комплекс белков митохондриальной поры; СурА – белок-активатор эндонуклеаз; ЭТЦ – электрон-транспортная цепь; АФК – активные формы кислорода; (-ATФ) над реакцией обозначает расход этого соединения в ходе процесса; считайте, что 1 кДа численно равен 1000 г/моль. Названия других белков мы умышленно не расшифровываем.

В тех случаях, когда процесс контролируют несколько факторов, они могут действовать независимо, а при совместном действии их эффекты суммируются. При решении задания не забывайте об осмотических эффектах, а также о том, что митохондрии служат одним из депо, поглощающим кальций при его повышении в цитозоле!



Для каждого из утверждений выберите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✗ Форма 1 XDH катализирует реакцию 1
- ✗ Высокая концентрация АФК в цитозоле вызывает выход цитохрома С из митохондрий через Bax/Bak-поры, что приводит к Cas3-зависимой клеточной смерти
- ✗ В случае умеренного повышения АФК исключительно в матриксе, добавление ингибиторов катепсинов приведет к тому, что доля клеток, претерпевших смерть, снизится
- ✗ Ингибиторы каспаз сильнее подавляют клеточную смерть, вызванную высокой концентрацией АФК в цитозоле, нежели вызванную низкой концентрацией АФК в цитозоле
- ✓ В тех случаях, когда энергетический метаболизм клетки существенно нарушен, эндогенные стимулы вызывают Cas3-зависимый апоптоз
- ✓ При одновременных увеличении внутриклеточной концентрации Ca<sup>2+</sup> и ингибировании каспаз, фрагментация ядерной ДНК не будет происходить из-за отсутствия Cas3-зависимого апоптоза

Время ответа: 19.03.2022 10:42:16



Баллы: 1.5 из 3

Задание ID21 (Задача № 1281474)

Бактериальная фосфотриэстераза (РТЕ) катализирует гидролиз Р-О, Р-Ф, Р-С связей в различных инсектицидах и фосфорорганических нервных ядах. Общую схему реакции вы можете видеть в верхней части рисунка. Кристаллографические работы показали, что фермент связывает свои субстраты при помощи трех участков в активном центре. В 2001 году Chen-Goodspeed с коллегами решили выяснить, какими факторами регулируется субстратная специфичность РТЕ. Для этого они воспользовались библиотекой фосфорорганических соединений, представленной в нижней левой части рисунка. Каждое из веществ добавляли к ферменту, после чего измеряли кинетические параметры реакции. В качестве критерия эффективности фермента использовали величину  $k_{cat}/K_M$ . Результаты некоторых измерений вы можете обнаружить в правой нижней части рисунка. Мы также указали примерное соотношение эффективностей катализа для каждой пары соединений (коэффициент селективности S/R, в правом верхнем углу окошка).



Субстрат	X	Y
R-II	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CH <sub>3</sub>
S-II	CH <sub>3</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
R-III	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sub>3</sub>
S-III	CH <sub>3</sub>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
R-IV	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	CH <sub>3</sub>
S-IV	CH <sub>3</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
R-VI	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
S-VI	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
R-VII	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
S-VII	CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>
R-IX	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
S-IX	CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	C <sub>6</sub> H <sub>5</sub>



Внимательно рассмотрите рисунок, после чего для каждого из утверждений выберите, является оно верным или неверным:


#### Ответ ученика

- ✓ Замены Phe132Gly/His257Tyr приведут к тому, что для пары S-II/R-II коэффициент селективности станет выше 1/1
- ✗ Фермент с мутацией Ile106Gly будет иметь более высокий коэффициент селективности в отношении пары S-IV/R-IV, нежели фермент с заменами Ile106Gly/Phe132Gly/His257Tyr/Ser308Gly
- ✓ Мутация Gly60Ala приведет к тому, что для пары S-III/R-III коэффициент селективности станет ниже 32/1
- ✓ Фермент с мутацией Gly60Ala будет иметь более высокий коэффициент селективности в отношении пары S-VII/R-VII, нежели фермент с заменами Ile106Gly/Phe132Gly/Ser308Gly
- ✓ Для фермента дикого типа коэффициент селективности в отношении пары S-IX/R-IX будет ниже 93/1
- ✗ В отношении пары S-IX/R-IX коэффициент селективности будет уменьшаться в ряду ферментов с мутациями Gly60Ala → Ile106Gly → Ile106Gly/Phe132Gly/His257Tyr/Ser308Gly

Время ответа: 19.03.2022 11:44:19

Баллы: 1 из 3

На рисунке изображена схема транспорта вещества X в клетку с помощью одного из типов транспортеров.



Проанализируйте представленную схему и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✓ Вещество X транспортируется в клетку по механизму вторично-активного транспорта
- ✓ Вещество X может являться аминокислотой
- ✗ Увеличение концентрации ионов натрия во внеклеточной среде приведёт к снижению транспорта вещества X в клетку
- ✓ Тип транспортера, изображённый на схеме, может функционировать в почке
- ✓ Ионы натрия транспортируются в клетку по механизму простой диффузии
- ✗ Ингибиция транспортера SGLT2, подобного приведенному на схеме, способно предотвращать реабсорбцию глюкозы в нефронах, что может использоваться для лечения сахарного диабета II типа


Время ответа: 19.03.2022 10:44:15

Баллы: 2 из 3

Задание ID26 (Задача № 1281488)

Дыхательная цепь митохондрий – один из основных путей синтеза АТФ в клетке. Использование различных модуляторов дыхательной цепи (см. рисунок ниже) позволяет рассчитать различные метаболические параметры.





Ротенон, антимицин А и олигомицин ингибируют соответственно комплексы I, III и V. FCCP является протонофором – он позволяет протонам свободно проникать через митохондриальную мембрану.

Изучите представленную схему и подумайте, как повлияет на работу дыхательной цепи добавление в клетку каждого из веществ. Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- Добавление ротенона способствует накоплению NADH
- Добавление олигомицина повысит потребление клеткой кислорода
- Максимальное потребление кислорода достигается добавлением FCCP
- Добавление FCCP полностью блокирует продукцию АТФ в клетке
- Чтобы оценить, какой процент потребления кислорода клеткой связан с продукцией АТФ, необходимо добавить олигомицин
- Добавление комбинации ротенона и антимицина А позволяет оценить немитохондриальное потребление кислорода клеткой

Время ответа: 19.03.2022 11:37:01

Баллы: 2 из 3

### Задание ID27 (Задача № 1281491)

На рисунке изображена схема одного из типов клеточных контактов.



Изучите схему и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Основная функция изображённого на схеме контакта – транспорт веществ между клетками
- На рисунке изображена схема полудесмосомы
- В формировании данного типа контакта принимает участие клаудин


- ✓ Промежуточные филаменты, с которыми связывается данный тип контакта, могут состоять из кератина
- ✓ Наиболее часто данный тип межклеточных контактов встречается в нервной ткани
- ✗ Данный тип контакта ограничивает диффузию ионов

Время ответа: 19.03.2022 10:47:35

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID31 (Задача № 1281503)

Относительно недавно было установлено, что насекомых (Insecta) следует рассматривать как сухопутную ветвь ракообразных (Crustacea). Это открытие изменило взгляды на эволюцию как ракообразных, так и насекомых, сформировав представление о таксоне Pancrustacea, который объединил ракообразных с шестиногими (Hexapoda, насекомые и их ближайшие родственники). Однако, несмотря на интенсивные исследования, точная картина родственных связей различных линий ракообразных еще не установлена. Ниже приведена филогения ракообразных и их ближайших родственников из типа членистоногие, построенная на основе большого объема геномных данных (Schwentner M. et al., 2017). Для каждого узла предлагаемого дерева приведена поддержка топологии в зависимости от применяемого метода вычислений и матрицы: черный цвет означает высокую поддержку, красный – низкую поддержку, а желтый – варьирование степени поддержки в разных итерациях методах. Если большое число разных методов с использованием разных матриц демонстрирует низкую поддержку, это означает высокую вероятность того, что топология в этом дереве в реальности может оказаться другой: имеющиеся данные не позволяют утверждать истинность этой топологии.



Проанализируйте представленную схему и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✓ Таксон Mandibulata, объединяющий многоножек (Myriapoda) и ракообразных в широком смысле (включая шестиногих), является монофилетическим
- ✓ Узел, в котором расходятся ветви Ремипедий (Remipedia) и Шестиногих (Hexapoda), имеет низкую поддержку. Согласно топологии представленного дерева Ремипедии (Remipedia), являются сестринской к группой к


- ✓ Шестиноги (Hexapoda)
- ✓ Высшие раки (Malacostraca) не являются ближайшими среди ракообразных родственниками Насекомым
- ✓ Низкие поддержки топологии дерева в основании Шестиногих (Hexapoda) позволяют предположить возможную немонофилетичность таксона
- ✗ Представленные данные позволяют рассматривать группу Cephalocorida как вероятных предков насекомых

Время ответа: 19.03.2022 10:52:21

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID33 (Задача № 1281509)

Мир РНК – гипотетический этап возникновения жизни на Земле, когда ансамбли молекул рибонуклеиновых кислот выполняли как функцию хранения генетической информации, так и катализ химических реакций. Впоследствии из их ассоциаций возникла современная ДНК-РНК-белковая жизнь, обособленная мембраной от внешней среды. Идея мира РНК была впервые высказана Карлом Вёзе в 1968 году. Вопрос эволюции современных клеток, использующих ДНК в качестве носителя наследственной информации, от гипотетических предков, использующих РНК для тех же целей, остается очень дискуссионным. Вероятно, большую роль в этих эволюционных процессах играли вирусы, которые могут использовать оба типа нуклеиновых кислот в качестве носителя генетической информации. На иллюстрации ниже приведена довольно спорная, но интересная гипотеза Патрика Фортера, предлагающая возможный эволюционный путь от РНК-организмов к ДНК.



Проанализируйте представленную схему и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным согласно предложенной концепции:

Ответ ученика

- ✗ РНК-вирусы являются потомками РНК-клеток
- ✓ Первыми использовать ДНК в качестве носителя генетической информации стали вирусы
- ✓ Первые ДНК-клетки появились в ходе заражения РНК-клетки ДНК-вирусом
- ✗ Первые ДНК-клетки появились в ходе встраивания генома РНК-вируса в геном хозяина
- ✗ Одноцепочечные нуклеиновые кислоты появились позже двухцепочечных в процессе эволюции  
Данная гипотеза согласуется с тем фактом, что ДНК – химически более стабильная молекула, чем РНК, что
- ✓ могло способствовать эволюционному переходу от использования РНК в качестве носителя информации к использованию ДНК


Время ответа: 19.03.2022 11:33:39

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID36 (Задача № 1281518)

Ниже приведены фотографии различных насекомых:





После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список систематических групп (отряды или подотряды) насекомых (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список типов ротовых аппаратов (список избыточен – в нем есть лишние названия).


**Загляните в глаза этим удивительным созданиям и соотнесите «портреты» насекомых (*Insecta*) с систематическими группами, к которым они относятся и типами имеющихся у них ротовых аппаратов.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетягните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика





Время ответа: 19.03.2022 10:57:16

Баллы: 3.5 из 5

### Задание ID38 (Задача № 1281524)

На фотографиях ниже изображены различные кости человека (масштаб не соблюден):

1



2



3



4



5



После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список названий костей (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).

В правом столбце приведен список названий мышц (список избыточен – в нем есть лишние названия).


**Определите название каждой из костей и соотнесите её с конкретной мышцей, к которой к ней прикрепляется из**

предложенного списка.

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика




Время ответа: 19.03.2022 11:02:37


Баллы: 3.5 из 5

### Задание ID40 (Задача № 1281530)

На рисунке представлено уравнение Михаэлиса-Ментен, описывающее скорость ( $v$ ) ферментативной реакции в зависимости от концентрации субстрата  $[S]$  при определенных условиях (которые, для простоты, мы опустим).  $V_{max}$  – максимальная скорость реакции,  $K_M$  – константа Михаэлиса, в ближайшем приближении характеризующая сродство фермента к субстрату. До эпохи персональных компьютеров работа с уравнением Михаэлиса-Ментен была не очень удобна, поскольку зависимость  $v$  от  $[S]$  нелинейна. Чтобы обойти данную проблему, ученые придумали различные способы линеаризации этого выражения. В частности, на рисунке вы можете видеть способ Хейнса-Вульфа. Мы выделили три численных параметра на графике (пересечение с осями X и Y, а также тангенс угла наклона).

$$v = \frac{[S] \cdot V_{max}}{[S] + K_M}$$





Известно, что активность ферментов может быть снижена добавлением ингибиторов. Конкурентные ингибиторы чаще всего соревнуются с субстратом за активный центр фермента. Неконкурентные ингибиторы не влияют на связывание фермента с субстратом, но снижают общую катализическую активность белка.

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список численных значений параметров (список избыточен).

В среднем столбце указаны номера параметров (указания на них приведены на рисунке выше).

В правом столбце приведен список свойств параметров.

**Установите правильные соответствия между параметрами графика (1-3), их численными значениями (A-L) и свойствами (I-III).**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика

A)  $1/V_{max}$

B)  $-1/V_{max}$

C)  $-1/K_M$

D)  $1/K_M$

E)  $K_M/V_{max}$

F)  $-K_M/V_{max}$

G)  $-K_M$


H)  $K_M$

I)  $V_{max}$

J)  $-V_{max}$

K)  $V_{max}/K_M$

L)  $-V_{max}/K_M$



Время ответа: 19.03.2022 11:31:33

Баллы: 0.5 из 3

### Задание ID42 (Задача № 1281536)

Большинство клеток человека несут диплоидный набор хромосом, однако в результате прохождения различных фаз клеточного деления, может меняться как количество хромосом в клетке – пloidность клетки ( $n$ ), так и количество нитей ДНК ( $c$ ), причём эти значения не всегда совпадают.

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список событий, происходящих во время различных фаз (список избыточен – в нем есть лишние события).

В среднем столбце указаны названия фаз деления.


В правом столбце приведен список количества хромосом (плоидность) и нитей ДНК в клетке (список избыточен – в нем есть лишние значения).

Соотнесите фазу клеточного деления с событием, происходящим во время этой фазы, и количеством хромосом (плоидностью) и нитей ДНК.

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика





Время ответа: 19.03.2022 11:05:05

Баллы: 5 из 5

### Задание ID44 (Задача № 1281542)

Палеонтологам часто приходится иметь дело с обрывочными сведениями о живых организмах. Иногда реконструкция всего облика древнего животного строится на основе фрагментов костей и сравнения с возможными родственниками. Кроме того, большая часть палеонтологического материала представлена следами жизнедеятельности организмов.

Ниже приведены фотографии различных палеонтологических материалов:





5

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список названий эр.

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список возможных систематических положений животных (список избыточен – в нем есть лишние элементы).

**Проанализируете представленные фотоматериалы и сделайте вывод о возможной таксономической принадлежности животного и вероятном отрезке геохронологической школы, в котором можно обнаружить представителей этого таксона.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетягните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



Время ответа: 19.03.2022 11:09:26


Баллы: 2.5 из 5

**Задание ID51 (Задача № 1281551)**

В левой части рисунка (отделенной вертикальной серой пунктирной линией) представлен энергетический профиль реакции, не катализируемой ферментом ( $\Phi$ ), который, тем не менее, присутствует в системе. Субстрат ( $S$ ) превращается в продукт ( $P$ ) через переходное состояние ( $\Pi$ ). В левой части рисунка («без катализа») координата реакции направлена влево.

На правой части рисунка изображена та же самая реакция, однако теперь ее катализирует фермент. Процесс начинается с образования фермент-субстратного комплекса ( $\Phi S$ ), который через комплекс фермента и переходного состояния ( $\Phi \Pi$ ) переходит в комплекс фермента и продукта ( $\Phi P$ ). Последний распадается на свободные фермент и продукт. Обратите внимание, что реакции образования комплексов фермента и субстрата, а также фермента и продукта характеризуются своими переходными состояниями ( $\Phi S^*$  и  $\Phi P^*$ ). Также в верхней части рисунка изображен воображаемый процесс образования комплекса между ферментом и свободным переходным состоянием. В правой части рисунка («с катализом») координата реакции направлена вправо.

Вертикальная ось, нанесенная на левую часть рисунка, обозначает энергию системы; состояние системы, представленное свободными ферментом и субстратом, принято за 0. На рисунке обозначены некоторые известные энергетические переходы ( $E_A, E_1, E_{-1}, E_2, E_{-2}$ , имеют положительное значение, выделены курсивом!). Значение перехода  $E_\Phi$  неизвестно. Термодинамические параметры образования комплекса между ферментом и некоторым соединением ( $X$ ) могут быть охарактеризованы константой диссоциации ( $K_{\Phi X}$ ). Инструкция по ее вычислению присутствует на рисунке (температуру  $T$  указывают в Кельвинах, число Эйлера приблизительно равно 2,71828). Чем больше данная величина, тем больше концентрации несвязанных фермента и соединения  $X$  в состоянии равновесия. При решении считайте, что пропорциональное равенство (~) соответствует точному равенству (=).



**Ответьте на следующие подвопросы:**

- 1) Рассчитайте значения энергии системы в следующих состояниях:  $\Phi S$ ,  $\Phi + \Pi$ ,  $\Phi P$ . Обозначьте их  $E_{\Phi S}$ ,  $E_{\Phi+\Pi}$ ,  $E_{\Phi P}$ . Используйте лишь известные переходы и помните, что они имеют векторный, а не скалярный характер.
- 2) Рассчитайте константы диссоциации комплексов фермент-субстрат ( $K_{\Phi S}$ ) и фермент-переходное состояние ( $K_{\Phi \Pi}$ ). Используйте значения  $E_{\Phi S}$ ,  $E_{\Phi+\Pi}$ ,  $E_{\Phi P}$ , полученные вами при ответе на подвопрос 1.
- 3) Как должны соотноситься  $E_A$  и  $E_\Phi$ , чтобы фермент выступал эффективным катализатором реакции? Предположите, что скорость процесса лимитируется самой медленной реакцией.
- 4) Рассчитайте  $E_\Phi$ , используя данные, полученные при ответе на подвопрос 1.

5) Как должны соотноситься  $E_{\text{ФС}}$  и  $E_{\text{ФГ}}$ , если средство фермента оказывает в отношении переходного состояния?

6) Докажите, что фермент будет выступать эффективным катализатором реакции, если его сродство к переходному состоянию реакции больше, чем сродство к субстрату.

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

Ответ ученика


- 1)  $E_{\text{ФС}} = E_1 - E_1$   
 $E_{\text{Ф}} + p = E_a$   
 $E_{\text{Ф}} p = E_{\text{Ф}} + p + E_2 - E_2$
- 3)  $E_a$  должно быть больше, чем  $E_{\text{Ф}}$
- 4)  $E_{\text{Ф}} = E_{\text{Ф}} + p + E_2 - E_2$
- 6) Если сродство к переходному состоянию больше, то работа фермента будет нацелена именно на данную реакцию, а если сродство к субстрату больше, то будет проблематичным возникновение переходного состояния и катализ именно данной реакции.

Время ответа: 19.03.2022 11:54:27

Баллы: 2.5 из 12

### Задание ID53 (Задача № 1281553)

Окрашивание клеток флуоресцентным красителем йодидом пропидия позволяет оценить количество ДНК в клетке. На рисунке вы видите гистограмму распределения соматических клеток с различным количеством ДНК. По ней можно определить процент популяции клеток, находящихся в различных фазах клеточного цикла. Область 2 на рисунке соответствует G1-фазе клеточного цикла.



Ответьте на следующие подвопросы:

- 1) Какой фазе клеточного цикла соответствует область гистограммы 3?
- 2) В какой области гистограммы находятся клетки в фазе G0?
- 3) В какой области гистограммы находятся клетки, делящиеся митозом?
- 4) К каким изменениям гистограммы приведёт обработка клеток нокодазолом, который нарушает полимеризацию микротрубочек?
- 5) О чём свидетельствует увеличение содержания клеток в области 1?

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы лаёте ответы!**

Ответ ученика

- 1)
- 2) в области гистограммы 4.
- 3) в области гистограммы 2. Там происходит резкое увеличение числа клеток, которое как раз увеличивается в результате митотического деления
- 4) из-за нарушения полимеризации микротрубочек будет нарушаться расхождение хромосом к полюсам клетки, будет происходить нарушение митотического деления, значит, на гистограмме в меньшей степени или совсем не будет выражено увеличение количества клеток.
- 5) об удвоении молекул ДНК в S-фазу.

Время ответа: 19.03.2022 11:25:30


Баллы: 0.5 из 10

---

### Задание ID4 (Задача № 1281334)

---

На рисунке показан поперечный срез одного из видоизменённых растительных органов.



Для каждого утверждения укажите, является оно верным или неверным для данного органа:

---

Ответ ученика

- ✓ Это поперечный срез видоизменённого корня
- ✓ Этот орган часто встречается у растений, обитающих на заболоченной почве
- ✗ Под цифрой 2 показана паренхима сердцевины
- ✗ Под цифрой 5 показана эпидерма
- ✓ Основная функция данного органа – поглощение воды из почвы
- ✗ Данный орган принадлежит однодольному растению

Время ответа: 19.03.2022 13:03:43


Баллы: 2 из 3

---

### Задание ID5 (Задача № 1281337)

---

На схеме показаны варианты развития мужского гаметофита (пыльцевого зерна) у цветковых растений.  
Начальная стадия (A) – микроспора.



Проанализировав схему, укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- Структуры под цифрой 2 являются гаплоидными
- Трёхклеточное пыльцевое зерно прорастает на стадии 3
- Под цифрой 3 показана спермиогенная клетка
- Под цифрой 2 показаны сперматозоиды
- При прорастании пыльцевого зерна спермиогенная клетка образует пыльцевую трубку
- Структура под цифрой 1 является гаплоидной


Время ответа: 19.03.2022 13:05:58

Баллы: 2 из 3

### Задание ID6 (Задача № 1281340)

На молекулярно-филогенетическом дереве цветковых растений (по Stevens, P.F., [www.mobot.org](http://www.mobot.org)) голубым цветом отмечены порядки, в которые входят растения-источники синей краски: вайда красильная (*Isatis tinctoria* L.) и индигофера красильная (*Indigofera tinctoria* L.).





Обозначения:

monocots – однодольные;

eudicots – высшие двудольные;

magnolioids – магнолиоиды или примитивные двудольные;

commelinids – коммелиниды;

rosids – розиды;

asterids – астериды;

rosidl/Fabidae – фабиды;

rosidII/Malvidae – мальвиды;

asteridl – астериды I;

asteridII – астериды II;

Проанализируйте дерево и укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Вайда и индигофера являются однодольными растениями
- Если объединить порядки Fabales и Brassicales, то вместе они образуют монофилетическую группу
- Индигофера входит в группу rosidII/Malvidae
- Вайда и индигофера имеют спайнолепестный венчик
- Вайда входит в группу rosids
- Цветок индигоферы является зигоморфным

Время ответа: 19.03.2022 13:08:56

Баллы: 3 из 3

### Задание ID11 (Задача № 1281354)

Известно, что у растительноядных млекопитающих пищеварительная система, в частности её отдельные органы, очень сложно устроены. Перед вами на фото представлена внутренняя поверхность одного из отделов такого органа.





Проанализируйте представленное фото и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✓ Это внутренняя поверхность отдела "книжка"
- ✗ Это внутренняя поверхность сычуга, который является самым большим отделом у жвачных парнокопытных
- ✓ Из отдела «сычуга» пища попадает обратно в пищевод на повторное пережёвывание
- ✓ Самым большим отделом многокамерного желудка у взрослых жвачных является рубец
- ✗ Многокамерный желудок является эволюционным приспособлением для переваривания растительных белков и свойственен представителям семейства Свиные (Suidae)
- ✓ Рубец, сетка и книжка имеют общее название "преджелудок"

Время ответа: 19.03.2022 13:10:14


Баллы: 2.5 из 3

---

### Задание ID12 (Задача № 1281358)

---

Известно, что строение определённого органа напрямую связано с его функцией. Перед вами на рисунке схематично изображён один из органов позвоночных.



Проанализируйте рисунок и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✓ Многокамерный желудок свойственен НЕ всем травоядным
- ✓ Многокамерный желудок домашней лошади состоит из 4-х камер
- ✗ Это матка крупного рогатого скота
- ✓ Этот орган состоит из 4-х камер
- ✓ Входное и выходное отверстия закрываются при помощи сфинкторов, регулируемых вегетативной нервной системой
- ✗ Это полый мышечный орган

Время ответа: 19.03.2022 13:12:07

Баллы: 2 из 3

### Задание ID16 (Задача № 1281458)

Баббл-тест – это высокочувствительный метод ультразвуковой диагностики сброса крови справо-налево (из малого круга кровообращения в большой, минуя микроциркуляторное русло). В кровеносные сосуды вводят смесь физиологического раствора NaCl с пузырьками воздуха, взбитую в шприце, далее производят регистрацию потока микропузырьков в сердце или в сосудах головного мозга методом ультразвука. К самым частым право-левым кровеносным шuntам относят открытое овальное окно и легочные шунты.



Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✗ Целесообразно производить инъекцию смеси микропузырьков в подключичную артерию
- ✗ Диаметр микропузырьков должен превышать диаметр капилляров
- ✗ При отсутствии право-левых шунтов у здорового человека сигналы от микропузырьков не регистрируются в левых отделах сердца
- ✗ Микропузырьковый сигнал при наличии легочных шунтов регистрируется раньше, чем при наличии открытого овального окна
- ✓ Регистрация микропузырькового сигнала в области легочных вен указывает на легочную локализацию право-левого шунта
- ✓ Открытое овальное окно присутствует в онтогенезе у всех людей

Время ответа: 19.03.2022 13:16:03

Баллы: 2 из 3

## Задание ID17 (Задача № 1281463)

Иван-Царевич устроил международный конкурс красоты для лягушек и жаб, чтобы найти среди них заколдованный Царевну. В финал вышло 5 красивых, но ядовитых претенденток:

Амазонская  
двуцветная лягушка  
(*Phyllomedusa bicolor*)



Эквадорская  
Трехцветная лягушка  
(*Epipedobates anthonyi*)



Колумбийская  
золотая лягушка  
(*Phylllobates terribilis*)



ДЕРМОРФИН  
Агонист мю-опиоидных  
рецепторов

Аргентинская песочная  
жаба (*Rhinella arenarum*)



АРЕНОБУФАГИН  
Блокатор  
 $\text{Na}^+/\text{K}^+$ -насоса

ЭПИБАТИДИН  
Неселективный агонист  
ацетилхолиновых рецепторов

Колорадская речная  
жаба (*Incilius alvarius*)



БУФОТЕНИН  
Агонист серотониновых  
рецепторов

БАТРАХОТОКСИН  
Ингибитор инактивации  
потенциал-зависимых  
 $\text{Na}^+$ -каналов

Царевич знал, что целовать ядовитых лягушек и жаб очень опасно, но забыл, какие признаки отравления могут появиться после общения с каждой из претенденток. Помогите Царевичу вспомнить их. Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✓ Батрахотоксин вызывает эйфорию, манию, диарею, дрожание конечностей
- ✗ Эпифатидин вызывает сердечные аритмии, диарею, галлюцинации
- ✓ Дерморфин вызывает центральную остановку дыхания, сужение зрачков и запоры
- ✓ Аренобуфагин может потенциально использоваться для уничтожения раковых клеток
- ✓ Дерморфин может потенциально использоваться как обезболивающее средство
- ✓ Буфотенин вызывает эйфорию, манию, диарею, дрожание конечностей


Время ответа: 19.03.2022 13:18:43

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID18 (Задача № 1281466)

Женский менструальный цикл – это сложный физиологический процесс, состоящий из синхронизированных циклических изменений в промежуточном головном мозге, яичниках, матке:





Соответственно, отсутствие менструаций (аменорея) может быть вызвано патологией промежуточного мозга, яичников или матки. Для выяснения причины аменореи производят функциональные пробы: с изолированным введением прогестерона, либо с последовательным введением эстрогена и прогестерона. Гормоны вводятся в организм извне, но с физиологическими дозировками и длительностью.

Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика


- ✓ Отсутствие менструации при последовательном введении эстрогена и прогестерона может возникать при патологии эндометрия матки
- ✓ Отсутствие менструации после изолированного введения прогестерона указывает на стойкое отсутствие овуляции зрелого фолликула
- ✗ Отсутствие менструации после изолированного введения прогестерона может возникать при гиперэстрогении
- ✓ Наступление менструации при последовательном введении эстрогена и прогестерона может возникать при выраженной эстрогеновой недостаточности
- ✗ Появление менструации после эстроген-прогестероновой пробы при низком уровне ФСГ указывает на патологию яичников
- ✓ Недостаточная продукция прогестерона при сохранной продукции эстрогена – это фактор риска злокачественной пролиферации клеток эндометрия


Время ответа: 19.03.2022 13:22:10

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID22 (Задача № 1281477)

На рисунке показан жизненный цикл коронавируса SARS-CoV-2. Для проникновения в клетку вирус своим S-белком взаимодействует с белком ACE2, расположенным на мембране клетки. Кроме того, для слияния вируса с мембранный клетки необходимо расщепление вирусного S-белка клеточной протеиназой TMPRSS2. В цитоплазме происходит трансляция вирусных полипротеинов pp1a и pp1ab, которые затем нарезаются вирусными протеиназами на отдельные неструктурные белки, часть из которых образует вирусную РНК-полимеразу (RdRp), осуществляющую репликацию вирусной геномной РНК и синтез вирусных мРНК. Синтез вирусных РНК идет в специальном репликативном компартменте, который собирается в клетке под действием вирусных белков. После трансляции вирусных структурных белков происходит сборка вирионов, которые покидают клетку. Расшифровка аббревиатур: ORF – открытая рамка считывания, ERGIC – компартмент, включающий везикулы от эндоплазматического ретикулума, направляющиеся в комплекс Гольджи.





Рассмотрите схему и решите, какие вещества могут использоваться в качестве препаратов, блокирующих жизненный цикл SARS-CoV-2? Для каждого предложенного вещества укажите, подходит оно (отметьте, как «верно») или нет (отметьте, как «неверно»):

Ответ ученика


- Вещества, ингибирующие только обратную транскриптазу
- Ингибиторы вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы
- Ингибиторы вирусных протеиназ, нарезающих полипротеины
- Альфа-аманитин – ингибитор клеточной РНК-полимеразы II
- Ингибиторы протеиназы TMPRSS2
- Антитела, блокирующие вирусную РНК

Время ответа: 19.03.2022 13:26:33

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID23 (Задача № 1281479)

На рисунке показан механизм реакции, катализируемой ферментом X и имеющей три основных этапа (1, 2, 3). Для простоты от фермента X показана только часть полипептидной цепи с остатком лизина (Lys) в активном центре. Также для простоты некоторые части показанных на рисунке молекул заменены буквой «B». Стрелки показывают перемещения электронных пар, волнистые линии – продолжение полимерных молекул. Обратите внимание, что на этапе (1) высвобождается побочный продукт Y, структура которого не показана.



Рассмотрите механизм реакции и укажите для каждого утверждения, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✗ Связи, показанные пунктирными линиями, по своей природе являются ковалентными
- ✓ Фермент X – это ДНК-лигаза
- ✓ Молекула Y – это аденоцимонофосфат
- ✓ Знаком «?» отмечено продолжение молекулы в сторону 3'-конца
- ✗ Фермент X – это РНК-полимераза
- ✓ Фермент X необходим для процесса репликации ДНК

Время ответа: 19.03.2022 14:29:06

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID24 (Задача № 1281484)


В недавно опубликованной научной статье ученые изучали пространственное взаимодействие между геном Sox2 и энхансером этого гена – SCR (Sox2 control region). Для этого ученые использовали специальную клеточную линию, полученную на основе эмбриональных стволовых клеток мыши. В такой линии на расстоянии 5 тысяч пар нуклеотидов (т.п.н.) от промотора Sox2 встроили массив сайтов связывания белка TetR (TetO-сайты), на расстоянии 8 т.п.н. от промотора Sox2 встроили массив сайтов связывания белка CymR (CuO-сайты), а в транскрибуируемую часть гена Sox2 встроили массив сайтов связывания белка оболочки бактериофага – MCP (MS2-сайты) (смотрите рис. А). Генетическое расстояние между промотором гена Sox2 и энхансером SCR составляет 200 т.п.н. Белок MCP связывается с сайтами MS2 только в составе молекулы РНК. Описанные генетические модификации затрагивали только одну из двух гомологичных хромосом. Ученые также доставили в полученные клетки гены, кодирующие белки TetR, MCP и CymR, при этом каждый был слит с флуоресцентным белком своего цвета, что делало описанные генетические элементы видимыми в флуоресцентном микроскопе (рис. Б).

На графике (рис. В) показана зависимость интенсивности флуоресценции сигнала MCP от времени в одной из клеток. Моменты времени, когда интенсивность сигнала превышала некое пороговое значение, обозначены горизонтальными черточками. На графике (рис. Г) собрана информация по популяции клеток – для каждой клетки горизонтальными черточками показаны моменты времени, когда интенсивность сигнала превышала пороговое значение. При этом клетки на графике ранжированы по суммарной интенсивности MCP-сигнала за время наблюдения: вверху клетки с самой высокой суммарной интенсивностью сигнала, к низу интенсивность сигнала убывает. Справа на этом графике для каждой клетки показано среднее расстояние (в микрометрах) между сигналами TetR и CymR. Это расстояние показано также для клеток, в которых не обнаруживался MCP-сигнал (правая нижняя часть графика). Графики типа «ящик с усами» (рис. Д) построены по данным графика нарис. Г. Графики на рис. Д отражают расстояния между TetR и CymR-сигналами для клеток, в которых не обнаруживался или обнаруживался MCP-сигнал. Здесь жирной горизонтальной чертой показано среднее значение, в границах «ящика» заключено 50% наблюдаемых значений и «усы» показывают минимальное и максимальное значения. Надпись «ns» и черная черта под ней показывают, что между группами отсутствует статистически достоверная разница.

Рис. А



Рис. Б



Флуоресцентные сигналы в ядре клетки

Рис. В




Рис. Г





Рис. Д



Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- Интенсивность транскрипции гена Sox2 в эмбриональных стволовых клетках мыши постоянна во времени
- Сигнал MCP отражает трансляцию гена Sox2
- Интенсивность транскрипции гена Sox2 не зависит от близости энхансера SCR к этому гену в пространстве ядра
- На всех стадиях клеточного цикла у клеток в исследуемой популяции можно обнаружить строго по одному сигналу TetR и CymR
- Необходимое условие транскрипции гена Sox2 – близость энхансера SCR к этому гену в пространстве ядра
- Суммарное время, когда ген Sox2 транскрибируется в клетке, одинаково во всех клетках в популяции

Время ответа: 19.03.2022 14:36:17

Баллы: 1.5 из 3

## Задание ID28 (Задача № 1281494)

В начале XX века возникла новая отрасль животноводства – разведение пушных зверей в неволе. Для организации зверофермы по разведению американских норок (*Neovison vison*) животных отлавливали в дикой природе и помещали в заранее подготовленные шеды (клетки для пушных зверей). Среди норок клеточного содержания человек вел искусственный отбор, оставляя для размножения особей, имеющих самые качественные шкурки и дающих хороший приплод. Пары для скрещивания тоже подбирал человек. Вскоре норководы стали сообщать о рождении детенышней необычных окрасов. Причём детеныши одинакового фенотипа зачатую рождались на разных зверофермах, между которыми никогда не было обмена норками. Таких детенышней выращивали с особым вниманием и оставляли для размножения. Впоследствии они стали родоначальниками цветных пород норок. Какие утверждения верно объясняют появление на зверофермах норок с новыми, неизвестными в дикой природе, окрасами. Для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- При организации звероферм у норок происходил дрейф генов, увеличивавший частоты рецессивных аллелей, которые отвечают за новые варианты окраски
- В природных популяциях норок присутствовали разнообразные рецессивные аллели, возникшие в результате естественных мутаций, но частота их встречаемости была очень низкой, поэтому в дикой природе они в основном встречались в гетерозиготе, а в искусственной популяции вышли в гомозиготу
- В природных популяциях мутации, влияющие на окрас шерсти, не возникали из-за действия естественного отбора
- Человек ограничивал свободу скрещивания, что случайным образом увеличивало вероятность рождения рецессивных гомозигот
- Искусственный отбор, проводимый человеком, стал причиной возникновения большого количества новых мутаций
- На разных зверофермах содержание норок в шедах (клетках для содержания пушных зверей) было организовано одинаково, что стало причиной возникновения одинаковых мутаций

Время ответа: 19.03.2022 14:38:14

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID29 (Задача № 1281497)

Юный натуралист описывал процесс передачи наследственности в клетках на примере американской норки (*Neovison vison*), но допустил ошибки. Зная, что у американской норки в диплоидном наборе 30 хромосом, для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- В интерфазе S количество молекул геномной ДНК не изменяется
- В интерфазе G2 в клетках американской норки содержится 60 молекул геномной ДНК
- В американской норке в метафазе первого деления мейоза по экватору выстраиваются 15 бивалентов

- ✓ В профазе митоза происходит репликация геномной ДНК, в результате чего к концу профазы клетки содержат 60 молекул геномной ДНК
- ✓ В метафазе митоза двуххроматидные хромосомы выстраиваются по экватору клетки
- ✓ После первого деления мейоза в клетках американской норки содержится 30 молекул геномной ДНК

Время ответа: 19.03.2022 14:21:25

Баллы: 3 из 3

## Задание ID30 (Задача № 1281500)

В живой уголок Станции юных натуралистов привезли трех взрослых американских норок (*Neovison vison*), одного самца и двух самок. Воспитанники станции соорудили вольер и с удовольствием наблюдали за животными. В период гона обе самки забеременели и принесли детенышней. Когда детеныши подросли, их вместе с родителями вернули на звероферму. Юным натуралистам предложили рассчитать, популяция какого состава могла бы сформироваться на Станции юных натуралистов, если бы детеныши остались. Известно, что исходные самки были гомозиготны по доминантному аллелю гена A, находящемуся в X-хромосоме ( $X^A X^A$ ), а самец был рецессивной гемизиготой ( $X^a Y$ ). Наставники ребят отметили, что никаких мутаций и хромосомных перестроек в популяции не происходит, все особи имеют возможность свободно скрещиваться, у них одинаковая fertильность, а все их потомки выживают и остаются в составе популяции. На основании наблюдений и заданных условий ребята высказали ряд гипотез. Для каждой из них укажите, является она верной или неверной:

Ответ ученика


- ✓ В первом поколении все детеныши женского пола будут иметь генотип  $X^A X^a$
- ✓ В Y-хромосоме нет гена A
- ✓ В популяции на момент равновесия частота встречаемости аллеля a составит 20%
- ✓ Со временем в популяции установится равновесие, которое будет сохраняться в последующих поколениях
- ✗ В популяции никогда не будет самок с генотипом  $X^a X^a$ , т.к. изначально этот аллель был только у самца
- ✗ Среди самок в популяции на момент равновесия будет 32% гетерозигот по гену A


Время ответа: 19.03.2022 14:19:28

Баллы: 2.5 из 3

## Задание ID32 (Задача № 1281506)

Вирус SARS-CoV-2 является причиной продолжающейся глобальной вспышки коронавирусного заболевания COVID-19. Другие вирусы той же филогенетической группы были ответственны за предыдущие региональные вспышки, включая SARS и MERS. SARS-CoV-2 имеет зоонозное происхождение, аналогичное вирусам-возбудителям этих предыдущих вспышек. Повторяющееся внедрение вирусов животных в человеческую популяцию, приводящее к вспышкам заболеваний, предполагает, что подобные эпидемии в будущем неизбежны. Таким образом, изучение происхождения и продолжающейся эволюции SARS-CoV-2 дает важную информацию для подготовки к будущим вспышкам и их предотвращению. Ниже представлены две иллюстрации из разных источников об эволюции SARS-CoV-2. На первой иллюстрации изображены четыре основных рода семейства коронавирусов (Coronaviridae), силуэтами обозначены животные – хозяева вируса, а розовым шрифтом – вирусы человека. На второй – более подробные данные для рода Betacoronavirus, к которому относится и SARS-CoV-2. В ней обратите внимание на длину ветвей, являющейся графическим отображением дистанций между последовательностями: чем выше дистанция, тем больше различий накоплено между последовательностями, что может говорить как о быстром накоплении изменений по действием отбора, так и о постепенным накоплении в течении большого промежутка времени. Так или иначе, дистанцию можно рассматривать в качестве меры родства между изучаемыми группами.





Проанализируйте представленные схемы и для каждого из следующих утверждений укажите, является оно верным или неверным:

Ответ ученика

- ✓ SARS-CoV-2 – не единственный вирус из рода Betacoronavirus, поражающий человека
- ✓ Коронавирусы летучих мышей (bat-related coronaviruses) и панголинов (pangolin-related coronaviruses) наиболее родственны SARS-CoV-2
- ✗ Во всех родах семейства Coronaviridae встречаются возбудители заболеваний человека
- ✓ Для всех вирусов семейства Coronaviridae хозяевами являются теплокровные животные
- ✗ Коронавирусы могут относительно легко менять хозяев в ходе эволюции
- ✗ Вирус MERS-CoV является более близким родственником вирусу SARS-CoV-2, чем вирус SARS-CoV


Время ответа: 19.03.2022 14:14:43

Баллы: 2.5 из 3

### Задание ID35 (Задача № 1281516)

В ходе эволюции у многих цветковых растений сформировались приспособления для взаимодействия с определённым типом опылителя.

Ниже приведены фотографии различных растений:





После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список опылителей (список избыточен – в нем есть лишние типы опылителей).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).


В правом столбце приведен список приспособлений цветка (список избыточен – в нем есть лишние характеристики).

**Рассмотрите фотографии цветков или соцветий и соотнесите их с основным характерным для них типом опылителя и приспособлениями для привлечения этого опылителя.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



Время ответа: 19.03.2022 13:32:48

Баллы: 4 из 5

### Задание ID37 (Задача № 1281521)

Ниже приведены изображения некоторых представителей отрядов класса Aves:





3



4



5

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список названий систематических групп (список избыточен – в нем есть лишние названия).

В среднем столбце указаны номера фотографий (сами фото приведены выше).

В правом столбце приведен список характеристик отрядов (список избыточен – в нем есть лишние характеристики).

**Используя данные о морфологии, экологии и систематики, соотнесите изображение с названием отряда и подходящей для него характеристикой.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика

- A) Отряд Гагарообразные (Gaviiformes)
- B) Отряд Голубеобразные (Columbiformes)
- C) Отряд Ястребообразные (Accipitriformes)
- D) Отряд Ракшеобразные (Coraciiformes)

Фото 1

I) Околоводные, хорошо ныряющие, исключительно рыбоядные птицы. Гнездятся в северных широтах

II) Птицы размером с дрозда с ночной активностью. На территории России встречается только 2 вида из этого отряда. Гнезда устраивают всегда на земле. Днём, обычно, сидят неподвижно, прижавшись к ветке и сучку

III) Птицы средних размеров с маленьким клювом и с хорошо выраженной восковицей. Среди них встречается много синантропных видов

IV) Птицы средних и мелких размеров с очень ярко окрашенным оперением и частичным срастанием фаланг пальцев. Среди них встречаются как рыбоядные, так и насекомоядные виды





Время ответа: 19.03.2022 13:39:05

Баллы: 4 из 5

### Задание ID39 (Задача № 1281529)

По данным ВОЗ, инсульт (острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к некрозу нервной ткани) – вторая по частоте причина смерти после ишемической болезни сердца. Первостепенной задачей врача является скорейшее установление причины инсульта для определения тактики лечения. На рисунках ниже изображена модель кровообращения ткани головного мозга:





После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список типов ишемического инсульта (список избыточен - в нем есть лишние элементы).

В среднем столбце указаны номера рисунков (сами рисунки приведены выше).


В правом столбце приведен список основных факторов риска (список избыточен - в нем есть лишние элементы).

**Установите тип ишемического инсульта и основной фактор риска его развития по картине расположения очагов ишемии, их контуру и размеру, а также по состоянию кровеносного русла.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика






Время ответа: 19.03.2022 14:56:39

Баллы: 4 из 5



### Задание ID41 (Задача № 1281535)

На рисунках показаны повреждения молекул ДНК (в каждом случае изображена только поврежденная часть молекулы), которые возникают под действием различных факторов физической и химической природы:






3



4



После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список причин появления повреждений.

В среднем столбце указаны номера формул (сами формулы приведены выше).


В правом столбце приведен список ферментов или путей репарации.

**Сопоставьте каждое повреждение с основной причиной его возникновения (список А-Е) и ферментом (или путем репарации), ответственным за исправление этого повреждения (список I-V).**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



Время ответа: 19.03.2022 13:44:26

Баллы: 5 из 5

## Задание ID43 (Задача № 1281539)

Ниже приведены различные генотипы растений, все гены расположены на разных хромосомах:

1. AABBCDDDEE
2. aabbCcddEe
3. AaBbccDdEe
4. AaBBCcddEe
5. aaBBccDdee

После данной формулировки задания приведены три столбца элементов для сопоставления:

В левом столбце приведен список количества типов гамет, которое способно образовывать растение (список избыточен – в нем есть лишние значения).

В среднем столбце указаны генотипы растений.


В правом столбце приведен список количества генотипических классов, которые можно получить при самоопылении растения (список избыточен – в нем есть лишние значения).

**Соотнесите генотип растения, количество типов гамет, которое данное растение способно образовывать, и количество генотипических классов, которые можно получить при самоопылении этого растения.**

Каждый элемент из среднего столбца можно соединить стрелкой только с одним элементом в левом столбце и/или в правом столбце. Каждая стрелка должна быть уникальной, т.е. провести две стрелки от двух элементов среднего столбца к одному и тому же элементу левого (или правого) столбца нельзя!

Для того, чтобы провести стрелку перетяните мышкой элемент к которому вы проводите стрелку поверх элемента от которого должна идти стрелка и отпустите. Чтобы отменить стрелку между элементами повторите их перемещение.

Ответ ученика



Время ответа: 19.03.2022 13:49:55


Баллы: 3.5 из 5

## Задание ID52 (Задача № 1281552)

Для бактериофага лямбда характерно два типа жизненных циклов – литический, когда фаг активно реплицируется и разрушает клетки кишечной палочки (*Escherichia coli*), или лизогенный, когда геном фага

встраивается в молекулу ДНК клетки бактерии в уникальный локус генома с помощью процесса, называемого сайт-специфической рекомбинацией. На рисунке 1 показана упрощенная схема регуляции экспрессии двух генов бактериофага – *cI* и *cro*. В случае лизического цикла с промотором  $P_R$  экспрессируется ген *cro*, а также другие гены, необходимые для протекания лизического цикла. Белок *cI* блокирует транскрипцию с промотора  $P_{RM}$  (стрелка с тупым концом), связываясь с последовательностью-оператором. В случае лизогенного цикла фаговая ДНК существует в виде профага, встроенного в ДНК бактериальной клетки. При этом активен промотор  $P_{RM}$ , с которого экспрессируется ген *cI*. Белок *cI* блокирует промотор  $P_R$ , также связываясь с оператором. Белок *cI* дополнительно активирует промотор  $P_{RM}$  (стрелка с острым концом), привлекая к нему РНК-полимеразу (в отличие от промотора  $P_R$  промотор  $P_{RM}$  является слабым и требует дополнительной активации).


## Рисунок 1



При заражении фагом лямбда клеток *E. coli*, равномерно покрывающих поверхность чашки Петри, в слое бактерий появляются так называемые бляшки – участки, где рост бактерий нарушен. Обычно при заражении культуры *E. coli* фагом дикого типа (WT) образуются в основном мутные бляшки (тип 1 на рисунке 2А, чашка А1), и меньшее количество полностью прозрачных бляшек (тип 2 на рисунке 2А, чашка А1). Если из бактерий в мутных бляшках (тип 1) вырастить культуру, а потом добавить к такой культуре фаг дикого типа, то заметных изменений не наблюдается (рисунок 2Б, чашка Б1).

Ученые обнаружили два мутанта фага лямбда – X и Y, которые образуют только прозрачные колонии при заражении клеток *E. coli* (рисунок 2А, чашки А2 и А3). Ученым удалось установить, что в этих штаммах содержится по одной точечной мутации (эти эксперименты здесь не описаны). При заражении бактерий, выращенных из бляшек типа 1 (полученных при заражении фагом дикого типа), фагом X замечено изменений не наблюдается (рисунок 2Б, чашка Б2). Однако если в таком эксперименте использовать мутантный фаг Y, то на чашке появляются прозрачные бляшки (рисунок 2Б, чашка Б3).

## Рисунок 2



Ответьте на следующие подвопросы:

- 1) Какой тип жизненного цикла преобладает у фагов в мутных бляшках (тип 1)?
- 2) Какой тип жизненного цикла преобладает у фагов в прозрачных бляшках (тип 2)?
- 3) Почему фаги дикого типа (WT) не дают бляшек на чашке с бактериями, выращенными из мутных бляшек (тип 1)?
- 4) Какими являются мутации в штаммах X и Y – доминантными или рецессивными? Объясните ваш ответ.
- 5) В какой (каких) последовательностях могла произойти мутация у штамма X? Считайте, что мутация делает последовательность, в которой она возникла, полностью нефункциональной. Объясните ваш ответ.
- 6) В какой (каких) последовательностях могла произойти мутация у штамма Y? Считайте, что мутация делает последовательность, в которой она возникла, полностью нефункциональной. Объясните ваш ответ.

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

Ответ ученика

- 1) литический тип, так как в колониях B1 и B2 не наблюдается бляшек. Они бы были, если бы тип был лизогенный: ген был бы встроен в днк бактерий и экспрессировался в новых колониях, были бы бляшки. Кроме того, вероятно, у бактерий срабатывал иммунный ответ, поэтому бляшки не появлялись. В случае лизогенного типа иммунный ответ практически невозможен. В литическом типе разрушаются клетки, из-за продуктов разрушения появляется помутнение
- 2) лизогенный тип. Нет продуктов разрушения клеток, поэтому бляшки прозрачные
- 3) из-за иммунной системы бактерий, научившихся бороться с этим вирусом. Ответ дан в п. 1
- 4) в штамме X - доминантные - не появляются бляшки в колонии B. В штамме Y - рецессивные - есть бляшки в колониях A и B.
- 5) в операторе
- 6) в промоторе PR

Время ответа: 19.03.2022 14:10:04

Баллы: 0 из 10

## Задание ID54 (Задача № 1281554)

Цвет шерсти у млекопитающих связан с работой фермента тирозиназы, который катализирует одну из реакций, необходимую для превращения тирозина в пигмент меланин. Тирозиназа накапливается в особых клеточных везикулах, меланосомах, где и происходит синтез пигмента. В свою очередь меланосомы образуются в клетках меланобластах, которые в процессе эмбрионального развития мигрируют из нервного гребня в эпидермис кожи, где превращаются в меланоциты – клетки, определяющие цвет кожи и шерсти.

У американских норок (*Neovison vison*) описан ген H, продукт которого играет ключевую роль в формировании меланобластов и миграции их из нервного гребня. Ген имеет два аллеля. Аллель дикого типа H определяет нормальное развитие меланобластов, и гомозиготы по данному аллелю имеют коричневую шерсть (фенотип дикого типа). У обладателей мутантного аллеля h нарушены биогенез и миграция меланобластов, в результате чего шерсть остается белой. Данный аллель кодоминирует по отношению к аллелю дикого типа. Гетерозиготы имеют легкий окрас (мелкие белые пятна на коричневом фоне). Кроме того, ген обладает плейотропным эффектом. Гомозиготы по аллелю h глухие, гетерозиготы и гомозиготы по аллелю H имеют нормальный слух.

Продукт другого гена M регулирует образование и перемещение меланосом в клетке. Доминантный аллель данного гена определяет фенотип дикого типа. Продукт рецессивного аллеля m работает менее эффективно, в результате чего образуется меньше меланосом и животные имеют светло-коричневый мех.

На звероферме разводят две чистые линии норок, фенотип которых связан с действием описанных генов. Норки линии Майл светло-коричневые. Норки линии Хедлунд белые и глухие.

Ответьте на следующие подвопросы:

- 1) Какой генотип имеют норки линий Майл и Хедлунд, если каждая из них несет мутацию только в одном из описанных генов?
- 2) Какие генотип и фенотип по признакам окраса шерсти и наличия слуха будут иметь гибриды F1 от скрещивания данных чистых линий?

- 3) В каком соотношении в F2 можно ожидать рождение глухих детенышей и детенышей с нормальным слухом?
- 4) Сколько фенотипических классов по признаку окраса шерсти можно ожидать в F2? Перечислите все возможные фенотипы и соответствующие им генотипы.
- 5) Какое расщепление можно ожидать в F2 одновременно по двум признакам – наличие слуха и цвет шерсти?

**При внесении ответа в поле ниже, пожалуйста, сохраняйте нумерацию подвопросов на которые вы даете ответы!**

---

Ответ ученика

1) линия Мойл - HHmm, так как рецессивный аллель m дает светло-коричневую окраску, а мутация только в одном гене, значит, это доминантные гомозиготы по гену H  
линия Хедлунд - hhMM. белые и глухие - проявление рецессивного аллеля h, по условию мутация только в одном гене, доминантные гомозиготы по гену M  
2) в F1 HhMm. будет пегий окрас из-за гетерозиготности по гену H.  
3) HhMm \* HhMm  
расщепление 1(HH):2(Hh):1(hh) по гену H. глухие детеныши - только hh, значит, по этому признаку расщепление 3(норм. слух):1(глухие)  
4) белая шерсть - hhMm hhMM hhmm  
коричневая шерсть - HHMm HHMM  
светло-коричневая шерсть - HHmm  
пегий окрас (коричневые и белые пятна) - HhMM HhMm  
пегий окрас (светло-коричневые и белые пятна) - Hhmm  
всего 5 фенотипических класса

Время ответа: 19.03.2022 14:51:39

Баллы: 5 из 10

---