

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 1

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(3^{x-1})}(x^2 - 11x + 19) + \log_{(27^{x-1})}(x^3) = \frac{2}{x-1}.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{|x+1|-2}} \leq \frac{1}{9+x}.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{3+4\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x.$$

4. Число 72350 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 7235072350723507235072350723507235072350. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

5. В параллелограмме $ABCD$ угол ADC равен $\arcsin \frac{\sqrt{24}}{5}$. Окружность Ω , проходящая через точки A , C и D , пересекает стороны AB и BC в точках N и L соответственно, причём $AN=11$, $BL=6$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (x^2 - xy + y^2)(x^2 - 36) \geq 0, \\ |x - 2 + y| + |x - 2 - y| \leq a? \end{cases}$$

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2\sqrt{3}$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что $\angle SAB = \arccos \frac{1}{4}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

8. Дан правильный 18-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 40° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 2

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(5^x)}(x^2 + 9x + 15) + \log_{(125^x)}(x^3) = \frac{2}{x}.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{|x-3|-1}} \leq \frac{1}{6-x}.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{1 + 7 \sin^2 x} = 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x.$$

4. Число 84605 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 846058460584605846058460584605846058460584605. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

5. В параллелограмме $ABCD$ угол BCD равен $\operatorname{arctg} \sqrt{15}$. Окружность Ω , проходящая через точки B , C и D , пересекает стороны AB и AD в точках T и E соответственно, причём $BT = 10$, $AE = 7$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (x^2 - xy + 3y^2)(y^2 - 25) \geq 0, \\ |x + 2 + y| + |y + 2 - x| \leq a? \end{cases}$$

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 4$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что угол между гранями SAB и ABC равен $\operatorname{arctg} 2$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

8. Дан правильный 24-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 45° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 3

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(2^x)}(x^2 - 6x - 15) + \log_{(8^x)}(x^3) = \frac{3}{x}.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{|x+2|-1}} \leq \frac{1}{5+x}.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{6 + \frac{22}{3} \sin^2 x} = 3 \cos x + \frac{2}{\sqrt{3}} \sin x.$$

4. Число 94850 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 94850948509485094850948509485094850948509485094850. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

5. В параллелограмме $ABCD$ угол ABC равен $\arcsin \frac{\sqrt{15}}{4}$. Окружность Ω , проходящая через точки A , B и C , пересекает стороны AD и CD в точках P и M соответственно, причём $AP = 3$, $CM = 6$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (2x^2 + 3xy + 2y^2)(49 - x^2) \leq 0, \\ |x + 3 + y| + |x + 3 - y| \leq a? \end{cases}$$

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что $\angle SAB = \arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

8. Дан правильный 30-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 30° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 4

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(5^{x-1})}(x^2 - 7x + 11) + \log_{(125^{x-1})}(x^3) = \frac{1}{x-1}.$$

2. Решите неравенство

$$\frac{1}{\sqrt{|x+3|-2}} \leq \frac{1}{7+x}.$$

3. Решите уравнение

$$\sqrt{3 + \frac{25}{2} \sin^2 x} = \sqrt{6} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x.$$

4. Число 83105 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 83105831058310583105831058310583105831058310583105. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

5. В параллелограмме $ABCD$ угол BAD равен $\operatorname{arctg} \sqrt{15}$. Окружность Ω , проходящая через точки A , B и D , пересекает стороны BC и CD в точках F и N соответственно, причём $BF = 7$, $DN = 1$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (2x^2 + 4xy + 3y^2)(64 - y^2) \leq 0, \\ |x - 3 + y| + |y - 3 - x| \leq a? \end{cases}$$

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2\sqrt{3}$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что угол между гранями SAB и ABC равен $\operatorname{arctg}(2\sqrt{3})$.

Найдите объём пирамиды $SABC$.

8. Дан правильный 36-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 45° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 5

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(6^{x-2})}(x^2) + \log_{(36^{x-2})}((x-5)^4) = \frac{2}{x-2}.$$

2. Решите уравнение

$$2\sqrt{7} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{27 + \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)}.$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{6|x-2|}{x^2+21}\right)^{x+\sqrt{x^2-6}} > 1.$$

4. Число 58964 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 589645896458964589645896458964589645896458964. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

5. Дана прямоугольная трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle BCD = 90^\circ$. Точка M – середина отрезка CD . Известно, что окружность радиуса 5 проходит через точки A и B и касается стороны CD в точке M , а $\cos \angle BMC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Найдите длины отрезков AB и BC , а также площадь трапеции.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (x^2 - xy + y^2)(|x - y| - 6) \geq 0, \\ x(x+2) + y(y-2) = a? \end{cases}$$

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $CP : PC_1$, если $BN : NB_1 = 3 : 4$.

8. Дан правильный 16-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 6

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(4^{x+4})}(x^4) + \log_{(2^{x+4})}((x+5)^2) = \frac{4}{x+4}.$$

2. Решите уравнение

$$\sqrt{38} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{37 - \sin 3x}.$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{6|2x+1|}{4x^2+15}\right)^{-x+\sqrt{x^2-1}} > 1.$$

4. Число 52168 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 521685216852168521685216852168521685216852168. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle ABC = 90^\circ$. Точка M – середина отрезка AB . Известно, что окружность радиуса 4 проходит через точки C и D и касается стороны AB в точке M , а $\cos \angle MDC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Найдите длины отрезков CD и AB , а также площадь трапеции.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (3x^2 + 3xy + 2y^2)(|x+y| - 8) \geq 0, \\ x(x-4) + y(y-2) = a? \end{cases}$$

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $BN : NB_1$, если $CP : PC_1 = 3 : 25$.

8. Дан правильный 18-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 7

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(3^{x-3})}((x-4)^2) + \log_{(9^{x-3})}(x^4) = \frac{2}{x-3}.$$

2. Решите уравнение

$$2\sqrt{6} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{23 + \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)}.$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{2|2x-3|}{x^2+10}\right)^{x+\sqrt{x^2-3}} > 1.$$

4. Число 51746 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 517465174651746517465174651746517465174651746. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle ADC = 90^\circ$. Точка K – середина отрезка CD . Известно, что окружность радиуса 3 проходит через точки A и B и касается стороны CD в точке K , а $\sin \angle KAD = \frac{1}{3}$. Найдите длины отрезков AB и CD , а также площадь трапеции.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (x^2 - 4xy + 7y^2)(10 - |x - y|) \leq 0, \\ x(x-2) + y(y+6) = a? \end{cases}$$

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $CP : PC_1$ и $BN : NB_1$, если $AK : KA_1 = 1 : 12$.

8. Дан правильный 20-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА «ФИЗТЕХ» ПО МАТЕМАТИКЕ 2013

БИЛЕТ 8

ШИФР _____

заполняется ответственным секретарём

1. Решите уравнение

$$\log_{(2^{x+1})}(x^2) + \log_{(4^{x+1})}((x+3)^4) = \frac{2}{x+1}.$$

2. Решите уравнение

$$\sqrt{29 + \sin 3x} = \sqrt{30} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right).$$

3. Решите неравенство

$$\left(\frac{4|x+1|}{x^2+8}\right)^{-x+\sqrt{x^2-2}} > 1.$$

4. Число 96182 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 9618296182961829618296182961829618296182. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычеркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle BAD = 90^\circ$. Точка K – середина отрезка AB . Известно, что окружность радиуса 6 проходит через точки C и D и касается стороны AB в точке K , а $\cos \angle KCB = \frac{1}{3}$. Найдите длины отрезков CD и AB , а также площадь трапеции.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (2x^2 - 5xy + 4y^2)(7 - |x + y|) \leq 0, \\ x(x - 6) + y(y + 4) = a? \end{cases}$$

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $BN : NB_1$, если $CP : PC_1 = 1 : 27$.

8. Дан правильный 14-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Олимпиада «Физтех» 2013 г.

БИЛЕТ 1

1. Решите уравнение $\log_{(3^{x-1})}(x^2 - 11x + 19) + \log_{(27^{x-1})}(x^3) = \frac{2}{x-1}$.

Ответ: $x = 9$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{1}{x-1} \log_3(x^2 - 11x + 19) + \frac{3}{3(x-1)} \log_3 x = \frac{2}{x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3(x^2 - 11x + 19) + \log_3 x = 2, \\ x-1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \log_3(x^3 - 11x^2 + 19x) = \log_3 9, \\ x \neq 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 11x^2 + 19x - 9 = 0, \\ x \neq 1, \\ x > 0. \end{cases}$$

Одним из корней кубического уравнения является $x = 1$. Разделив уголок на $x - 1$, получаем уравнение $(x - 1)(x^2 - 10x + 9) = 0$, откуда $x = 1$ или $x = 9$. В ОДЗ входит только корень $x = 9$.

2. Решите неравенство $\frac{1}{\sqrt{|x+1|-2}} \leq \frac{1}{9+x}$.

Ответ: $x \in (-9; -7]$.

Решение.

1-й способ. Переносим в одну часть и приводим дроби к общему знаменателю: $\frac{\sqrt{|x+1|-2} - 9 - x}{(9+x)\sqrt{|x+1|-2}} \geq 0$.

Находим нули знаменателя: $9 + x = 0 \Leftrightarrow x = -9$; $\sqrt{|x+1|-2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = 1. \end{cases}$

Находим нули числителя: $\sqrt{|x+1|-2} - 9 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x+9 \geq 0, \\ |x+1|-2 = (x+9)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -9, \\ \begin{cases} x+1 = 2 + (x+9)^2, \\ x+1 = -2 - (x+9)^2. \end{cases} \end{cases}$

Первое уравнение совокупности не имеет решений, а из второго находим, что $x = -7$ или $x = -12$. Неравенству $x \geq -9$ удовлетворяет только $x = -7$, т.е. числитель обращается в ноль только при $x = -7$.

Находим ОДЗ: $|x+1|-2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$.

Далее решаем методом интервалов: из каждого промежутка, принадлежащего ОДЗ, подставляем какое-либо значение x и определяем знак левой части в этой точке. В итоге промежутки $(-\infty; -9)$, $(-7; -3)$ и $(1; +\infty)$ не подходят, а промежуток $(-9; -7)$ – подходит. Также не забываем включить в ответ точку $x = -7$ – ноль числителя.

2-й способ. При отрицательной правой части решений нет, поэтому $x + 9 > 0$. Умножаем обе части неравенства на *положительное* выражение $(x+9)\sqrt{|x+1|-2}$ и получаем неравенство $\sqrt{|x+1|-2} \geq x+9$, равносильное исходному. Поскольку правая часть больше нуля, возведение в квадрат является равносильным преобразованием. Получаем

$$|x+1|-2 \geq x^2 + 18x + 81 \Leftrightarrow |x+1| \geq x^2 + 18x + 83 \Leftrightarrow \begin{cases} x+1 \geq x^2 + 18x + 83, \\ x+1 \leq -x^2 - 18x - 83 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 17x + 82 \leq 0, \\ x^2 + 19x + 84 \leq 0. \end{cases}$$

Первое неравенство совокупности не имеет решений, а из второго получаем, что $x \in [-12; -7]$. Учитывая ограничение $x + 9 > 0$, окончательно находим $x \in (-9; -7]$.

3. Решите уравнение $\sqrt{3+4\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x$.

Ответ: $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k, x = -\arctg \frac{\sqrt{3}}{4} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению

$$3 + 4\cos^2 x = \frac{\sin^2 x}{3} + 2\sqrt{3}\sin x \cos x + 9\cos^2 x \quad (*)$$

при условии $\frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x \geq 0$. Используя основное тригонометрическое тождество

($3 \rightarrow 3\cos^2 x + 3\sin^2 x$) и приводя подобные слагаемые, получаем: $2\cos^2 x + 2\sqrt{3}\sin x \cos x - \frac{8}{3}\sin^2 x = 0$.

Подстановкой убеждаемся, что при $\sin x = 0$ решений нет. Если разделить обе части на $2\sin^2 x$, то выходит квадратное уравнение относительно $\operatorname{ctg} x$: $\operatorname{ctg}^2 x + \sqrt{3}\operatorname{ctg} x - \frac{4}{3} = 0$, решая которое, находим, что

$\operatorname{ctg} x = -\frac{4}{\sqrt{3}}$ или $\operatorname{ctg} x = \frac{1}{\sqrt{3}}$. Следовательно, $x = -\arctg \frac{\sqrt{3}}{4} + \pi k$ или $x = \frac{\pi}{3} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Условию $\frac{\sin x}{\sqrt{3}} + 3\cos x \geq 0$ удовлетворяют только значения $x = -\arctg \frac{\sqrt{3}}{4} + 2\pi k$ и $x = \frac{\pi}{3} + 2\pi k$.

Примечание. Уравнение (*) с помощью формул понижения степени и двойного угла можно также преобразовать к виду $3\sqrt{3}\sin 2x + 7\cos 2x = 1$. Если далее решать это уравнение, вводя вспомогательный угол, то ответ может быть получен, например, в таком виде:

$$(a) \quad x = \frac{1}{2} \arccos \frac{7}{2\sqrt{19}} \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2\sqrt{19}} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \text{ или}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{2\sqrt{19}} - \frac{1}{2} \arccos \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arccos \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{19}} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{2\sqrt{19}} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

4. Число 72350 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 7235072350723507235072350723507235072350. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 216.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 15, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 3 и на 5. Для делимости на 5 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0 или 5. Значит, полученное число будет делиться на 5, если мы вычеркнем любые две цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 7 на 1, цифры 3 на 0, а цифры 5 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 12020120201202012020120201202012020$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 35. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две единицы, либо б) двойку и ноль. Количество способов вычеркнуть две единицы равно $C_7^2 = 21$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну двойку равно $C_{14}^1 \cdot C_{14}^1 = 14 \cdot 14 = 196$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $196 + 21 - 1 = 216$ способов.

5. В параллелограмме $ABCD$ угол ADC равен $\arcsin \frac{\sqrt{24}}{5}$. Окружность Ω , проходящая через точки

A, C и D , пересекает стороны AB и BC в точках N и L соответственно, причём $AN = 11, BL = 6$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

Ответ: $S = 60\sqrt{6}$, $R = \frac{5\sqrt{265}}{4\sqrt{6}}$.

Решение. Трапеция $ADCN$ вписана в окружность, поэтому она равнобокая, $CN = AD$. Противоположные стороны параллелограмма равны: $BC = AD$. Следовательно, $CN = BC$, поэтому треугольник BNC равнобедренный. $\angle CBN = \angle ADC = \arcsin \frac{\sqrt{24}}{5} = \arccos \frac{1}{5}$. Пусть CH – высота треугольника BNC .

Тогда $\frac{1}{5} = \cos \angle HBC = \frac{BH}{BC} = \frac{BN}{2BC}$. Если обозначить $BC = 5x$, то $BN = 2x$.

Из точки B к окружности проведены секущие BLC и BNA . По теореме о двух секущих получаем, что $BN \cdot BA = BL \cdot BC$, т.е. $2x(2x + 11) = 6 \cdot 5x$, откуда $x = 2$. Значит, $BC = 10$, $AB = 15$. Поэтому площадь S параллелограмма $ABCD$ равна $AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = 15 \cdot 10 \cdot \frac{2\sqrt{6}}{5} = 60\sqrt{6}$.

Окружность Ω является описанной около треугольника ADC . Её радиус R равен $\frac{AC}{2 \sin \angle ADC}$. Сто-
рону AC находим по теореме косинусов из треугольника ADC : $AC^2 = 100 + 225 - 2 \cdot 10 \cdot 15 \cdot \frac{1}{5} = 265$. По-

этому $AC = \sqrt{265}$, а $R = \sqrt{265} : \frac{4\sqrt{6}}{5} = \frac{5\sqrt{265}}{4\sqrt{6}}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (x^2 - xy + y^2)(x^2 - 36) \geq 0, \\ |x - 2 + y| + |x - 2 - y| \leq a? \end{cases}$$

Ответ: $4 \leq a < 8$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = x^2 - xy + y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = y^2 - 4y^2 = -3y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, первое неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 0, \\ x^2 - 36 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x \in (-\infty; -6] \cup [6; +\infty). \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $x = -6$ и левее неё, точки на прямой $x = 6$ и правее неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём ко второму неравенству. Проведём на координатной плоскости прямые $x - 2 + y = 0$ и $x - 2 - y = 0$. Они разбивают плоскость на 4 области, в каждой из которых знаки выражений под модулями постоянны. Рассматриваем 4 случая.

Если $x - 2 + y \geq 0$ и $x - 2 - y \geq 0$, то неравенство принимает вид $x - 2 + y + x - 2 - y \leq a \Leftrightarrow x \leq 2 + \frac{a}{2}$.

Аналогично, если $x - 2 + y < 0$ и $x - 2 - y \geq 0$, то $-x + 2 - y + x - 2 - y \leq a \Leftrightarrow y \geq -\frac{a}{2}$.

Если $x - 2 + y < 0$ и $x - 2 - y < 0$, то $-x + 2 - y - x + 2 + y \leq a \Leftrightarrow x \geq 2 - \frac{a}{2}$.

Если $x - 2 + y \geq 0$ и $x - 2 - y < 0$, то $x - 2 + y - x + 2 + y \leq a \Leftrightarrow y \leq \frac{a}{2}$.

Окончательно получаем, что при $a = 0$ неравенство задаёт точку $(2; 0)$, при $a > 0$ – квадрат с центром в точке $(2; 0)$ и стороной a , а при $a < 0$ – пустое множество.

Очевидно, при $a \leq 0$ система не имеет решений. При $a > 0$ для того, чтобы было единственное решение, нужно, чтобы точка $(0; 0)$ попадала в квадрат, но чтобы квадрат не пересекал прямую $x = 6$, откуда следует, что $2 \leq \frac{a}{2} < 4$, т.е. $4 \leq a < 8$.

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2\sqrt{3}$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что $\angle SAB = \arccos \frac{1}{4}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: а) 0; б) 1:2; в) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Решение. Пусть O – центр сферы ω ; K, L, M – основания перпендикуляров, опущенных из точки O на рёбра AS, BS, CS соответственно; SH – высота пирамиды $SABC$; r и R – радиусы сфер ω и Ω соответственно.

а) Поскольку точка O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AS , она равноудалена от концов этого отрезка, т.е. $OA = OS$. Аналогично $OB = OS$ и $OC = OS$. Значит, $OA = OB = OC = OS$, поэтому точка O является центром сферы Ω . Следовательно, расстояние между центрами сфер равно нулю.

б) Из равенства прямоугольных треугольников SOK, SOL и SOM ($OK = OL = OM = r, OS$ – общая сторона) следует, что $SK = SL = SM$. Поскольку точки K, L, M – это середины боковых рёбер пирамиды, отсюда получаем, что боковые рёбра равны между собой. Тогда высота пирамиды проходит через центр окружности, описанной около основания (действительно, $\Delta SHA = \Delta SHB = \Delta SHC$ по катету и гипотенузе, откуда $AH = BH = CH$). Но в пирамиде $OABC$ боковые рёбра OA, OB, OC также равны между собой как радиусы сферы Ω ; значит, и её высота, проведённая из вершины O проходит через центр окружности, описанной около основания. Таким образом, высота пирамиды SH проходит через точку O . Кроме того, точка H является центром окружности, описанной около основания. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, H – это середина гипотенузы BC . Так как отрезок OH перпендикулярен плоскости основания, он равен радиусу r сферы ω .

Для нахождения соотношения между радиусами рассмотрим прямоугольный треугольник SHC . Точка M – середина гипотенузы SC , на катете SH находится точка O , причём $SO = CO = R, OH = OM = r$. Треугольники CHO, CMO и SOM равны по катету и гипотенузе, следовательно, $CH = CM = SM$. Значит, $CH = \frac{1}{2}SM, \angle HSC = 30^\circ$. Тогда из треугольника SOM находим, что $r : R = 1 : 2$.

в) $SC = 2CH = BC = 2\sqrt{3}$, поэтому треугольник SBC – равносторонний, $SH = SB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. В равнобедренном треугольнике SAB известны боковые стороны $SB = SA = 2\sqrt{3}$ и угол при основании $\angle SAB = \arccos \frac{1}{4}$. Отсюда находим, что $AB = 2SA \cdot \cos \angle SAB = \sqrt{3}$. По теореме Пифагора для треугольника

ABC находим, что $AC = 3$, поэтому $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \sqrt{3}$; объём пирамиды V равен $\frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

8. Дан правильный 18-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 40° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 216.

Решение. Опишем вокруг 18-угольника окружность. Будем считать, что длина окружности равна 18 (тогда длина дуги между соседними вершинами равна 1). Вписанный угол в 40 градусов стягивает дугу длиной 4. Значит, для данной вершины A найдутся $18 - 4 - 1 = 13$ (неупорядоченных) пар вершин (B, C) , для которых $\angle BAC = 40^\circ$. Суммируя по всем вершинам, получаем $13 \cdot 18 = 234$ тройки вершин. При таком подсчёте дважды учтены 18 равнобедренных треугольников с углами $40^\circ, 40^\circ, 100^\circ$ (положение равно-

бедренного треугольника однозначно определяется положением его вершины), поэтому в итоге получаем $234 - 18 = 216$ способов расположения точек.

БИЛЕТ 2

1. Решите уравнение $\log_{(5^x)}(x^2 + 9x + 15) + \log_{(125^x)}(x^3) = \frac{2}{x}$.

Ответ: $x = 1$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{1}{x} \log_5(x^2 + 9x + 15) + \frac{3}{3x} \log_5 x = \frac{2}{x} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_5(x^2 + 9x + 15) + \log_5 x = 2, \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$
$$\begin{cases} \log_5(x^3 + 9x^2 + 15x) = \log_5 25, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + 9x^2 + 15x - 25 = 0, \\ x > 0 \end{cases}$$

Одним из корней кубического уравнения является $x = 1$. Разделив уголок на $x - 1$, получаем уравнение $(x - 1)(x^2 + 10x + 25) = 0$, откуда $x = 1$ или $x = -5$. В ОДЗ входит только корень $x = 1$.

2. Решите неравенство $\frac{1}{\sqrt{|x-3|-1}} \leq \frac{1}{6-x}$.

Ответ: $x \in [5; 6)$.

Решение.

1-й способ. Переносим в одну часть и приводим дроби к общему знаменателю: $\frac{\sqrt{|x-3|-1} - 6 + x}{(6-x)\sqrt{|x-3|-1}} \geq 0$.

Находим нули знаменателя: $6 - x = 0 \Leftrightarrow x = 6$; $\sqrt{|x-3|-1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ x = 2. \end{cases}$

Находим нули числителя: $\sqrt{|x-3|-1} - 6 + x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 6 - x \geq 0, \\ |x-3|-1 = (6-x)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 6, \\ \begin{cases} x-3 = 1 + (6-x)^2, \\ x-3 = -1 - (6-x)^2. \end{cases} \end{cases}$

Второе уравнение совокупности не имеет решений, а из первого находим, что $x = 5$ или $x = 8$. Неравенству $x \leq 6$ удовлетворяет только $x = 5$, т.е. числитель обращается в ноль только при $x = 5$.

Находим ОДЗ: $|x-3|-1 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 2) \cup (4; +\infty)$.

Далее решаем методом интервалов: из каждого промежутка, принадлежащего ОДЗ, подставляем какое-либо значение x и определяем знак левой части в этой точке. В итоге промежутки $(-\infty; 2)$, $(4; 5)$ и $(6; +\infty)$ не подходят, а промежуток $(5; 6)$ – подходит. Также не забываем включить в ответ точку $x = 5$ – ноль числителя.

2-й способ. При отрицательной правой части решений нет, поэтому $6 - x > 0$. Умножаем обе части неравенства на *положительное* выражение $(6-x)\sqrt{|x-3|-1}$ и получаем неравенство $\sqrt{|x-3|-1} \geq 6 - x$, равносильное исходному. Поскольку правая часть больше нуля, возведение в квадрат является равносильным преобразованием. Отсюда

$$|x-3|-1 \geq x^2 - 12x + 36 \Leftrightarrow |x-3| \geq x^2 - 12x + 37 \Leftrightarrow \begin{cases} x-3 \geq x^2 - 12x + 37, \\ x-3 \leq -x^2 + 12x - 37 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 13x + 40 \leq 0, \\ x^2 - 11x + 34 \leq 0. \end{cases}$$

Второе неравенство совокупности не имеет решений, а из первого получаем, что $x \in [5; 8]$. Учитывая ограничение $6 - x > 0$, окончательно находим $x \in [5; 6)$.

3. Решите уравнение $\sqrt{1 + 7 \sin^2 x} = 2 \cos x - \sqrt{3} \sin x$.

Ответ: $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k$, $x = \arctg \frac{\sqrt{3}}{5} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению

$$1 + 7 \sin^2 x = 4 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \sin x \cos x + 3 \sin^2 x \quad (*)$$

при условии $2 \cos x - \sqrt{3} \sin x \geq 0$. Используя основное тригонометрическое тождество ($1 \rightarrow \cos^2 x + \sin^2 x$) и приводя подобные слагаемые, получаем: $3 \cos^2 x - 4\sqrt{3} \sin x \cos x - 5 \sin^2 x = 0$. Подстановкой убеждаемся, что при $\sin x = 0$ решений нет. Если разделить обе части на $\sin^2 x$, то выходит квадратное уравнение относительно $\operatorname{ctg} x$: $3 \operatorname{ctg}^2 x - 4\sqrt{3} \operatorname{ctg} x - 5 = 0$, решая которое, находим, что $\operatorname{ctg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ или $\operatorname{ctg} x = \frac{5}{\sqrt{3}}$. Следовательно, $x = -\frac{\pi}{3} + \pi k$ или $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{5} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Условию $2 \cos x - \sqrt{3} \sin x \geq 0$ удовлетворяют только значения $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{5} + 2\pi k$ и $x = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k$.

Примечание. Уравнение (*) с помощью формул понижения степени и двойного угла можно также преобразовать к виду $4 \cos 2x - 2\sqrt{3} \sin 2x = 1$. Если далее решать это уравнение, вводя вспомогательный угол, то ответ может быть получен, например, в таком виде:

$$(a) \quad x = -\frac{1}{2} \arccos \frac{2}{\sqrt{7}} \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \text{ или}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{2\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} + \frac{1}{2} \arcsin \frac{1}{2\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

4. Число 84605 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 84605846058460584605846058460584605846058460584605. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 216.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 15, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 3 и на 5. Для делимости на 5 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0 или 5. Значит, полученное число будет делиться на 5, если мы вычеркнем любые две цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 8 и 5 на 2, цифры 4 на 1, а цифры 6 на 0, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 21002210022100221002210022100221002$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 35. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две единицы, либо б) двойку и ноль. Количество способов вычеркнуть две единицы равно $C_7^2 = 21$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну двойку равно $C_{14}^1 \cdot C_{14}^1 = 14 \cdot 14 = 196$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $196 + 21 - 1 = 216$ способов.

5. В параллелограмме $ABCD$ угол BCD равен $\operatorname{arctg} \sqrt{15}$. Окружность Ω , проходящая через точки B , C и D , пересекает стороны AB и AD в точках T и E соответственно, причём $BT = 10$, $AE = 7$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

$$\text{Ответ: } S = 28\sqrt{15}, \quad R = \frac{4\sqrt{17}}{\sqrt{5}}.$$

Решение. Трапеция $CBTD$ вписана в окружность, поэтому она равнобокая, $CB = TD$. Противоположные стороны параллелограмма равны: $BC = AD$. Следовательно, $TD = AD$, поэтому треугольник ADT равнобедренный. $\angle DAT = \angle BCD = \operatorname{arctg} \sqrt{15} = \arccos \frac{1}{4} = \arcsin \frac{\sqrt{15}}{4}$. Пусть DH – высота треугольника ADT . Тогда $\frac{1}{4} = \cos \angle TAD = \frac{AH}{AD} = \frac{AT}{2AD}$. Если обозначить $AT = x$, то $AD = 2x$.

Из точки A к окружности проведены секущие AED и ATB . По теореме о двух секущих получаем, что $AT \cdot AB = AE \cdot AD$, т.е. $x(x+10) = 7 \cdot 2x$, откуда $x = 4$. Значит, $AB = 14$, $AD = 8$. Поэтому площадь S параллелограмма $ABCD$ равна $AB \cdot AD \cdot \sin \angle BAD = 14 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = 28\sqrt{15}$.

Окружность Ω является описанной около треугольника BDC . Её радиус R равен $\frac{BD}{2 \sin \angle BCD}$. Сторону BD находим по теореме косинусов из треугольника BDC : $BD^2 = 64 + 196 - 2 \cdot 14 \cdot 8 \cdot \frac{1}{4} = 204$. Поэтому $BD = 2\sqrt{51}$, а $R = 2\sqrt{51} : \frac{2\sqrt{15}}{4} = \frac{4\sqrt{17}}{\sqrt{5}}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (x^2 - xy + 3y^2)(y^2 - 25) \geq 0, \\ |x + 2 + y| + |y + 2 - x| \leq a? \end{cases}$$

Ответ: $4 \leq a < 6$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = x^2 - xy + 3y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = y^2 - 12y^2 = -11y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, первое неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} x^2 - xy + 3y^2 = 0, \\ y^2 - 25 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \in (-\infty; -5] \cup [5; +\infty). \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = -5$ и ниже неё, точки на прямой $y = 5$ и выше неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём ко второму неравенству. Проведём на координатной плоскости прямые $x + 2 + y = 0$ и $y + 2 - x = 0$. Они разбивают плоскость на 4 области, в каждой из которых знаки выражений под модулями постоянны. Рассматриваем 4 случая.

Если $x + 2 + y \geq 0$ и $y + 2 - x \geq 0$, то неравенство принимает вид $x + 2 + y + y + 2 - x \leq a \Leftrightarrow y \leq -2 + \frac{a}{2}$.

Аналогично, если $x + 2 + y < 0$ и $y + 2 - x \geq 0$, то $-x - 2 - y + y + 2 - x \leq a \Leftrightarrow x \geq -\frac{a}{2}$.

Если $x + 2 + y < 0$ и $y + 2 - x < 0$, то $-x - 2 - y - y - 2 + x \leq a \Leftrightarrow y \geq -2 - \frac{a}{2}$.

Если $x + 2 + y \geq 0$ и $y + 2 - x < 0$, то $x + 2 + y - y - 2 + x \leq a \Leftrightarrow x \leq \frac{a}{2}$.

Окончательно получаем, что при $a = 0$ неравенство задаёт точку $(0; -2)$, при $a > 0$ – квадрат с центром в точке $(0; -2)$ и стороной a , а при $a < 0$ – пустое множество.

Очевидно, при $a \leq 0$ система не имеет решений. При $a > 0$ для того, чтобы было единственное решение, нужно, чтобы точка $(0; 0)$ попадала в квадрат, но чтобы квадрат не пересекал прямую $y = -5$, откуда следует, что $2 \leq \frac{a}{2} < 3$, т.е. $4 \leq a < 6$.

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 4$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что угол между гранями SAB и ABC равен $\arctg 2$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: а) 0; б) 1:2; в) 4.

Решение. Пусть O – центр сферы ω ; K, L, M – основания перпендикуляров, опущенных из точки O на рёбра AS, BS, CS соответственно; SH – высота пирамиды $SABC$; r и R – радиусы сфер ω и Ω соответственно.

а) Поскольку точка O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AS , она равноудалена от концов этого отрезка, т.е. $OA = OS$. Аналогично $OB = OS$ и $OC = OS$. Значит, $OA = OB = OC = OS$, поэтому точка O является центром сферы Ω . Следовательно, расстояние между центрами сфер равно нулю.

б) Из равенства прямоугольных треугольников SOK, SOL и SOM ($OK = OL = OM = r$, OS – общая сторона) следует, что $SK = SL = SM$. Поскольку точки K, L, M – это середины боковых рёбер пирамиды, отсюда получаем, что боковые рёбра равны между собой. Тогда высота пирамиды проходит через центр окружности, описанной около основания (действительно, $\Delta SHA = \Delta SHB = \Delta SHC$ по катету и гипотенузе, откуда $AH = BH = CH$). Но в пирамиде $OABC$ боковые рёбра OA, OB, OC также равны между собой как радиусы сферы Ω ; значит, и её высота, проведённая из вершины O проходит через центр окружности, описанной около основания. Таким образом, высота пирамиды SH проходит через точку O . Кроме того, точка H является центром окружности, описанной около основания. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, H – это середина гипотенузы BC . Так как отрезок OH перпендикулярен плоскости основания, он равен радиусу r сферы ω .

Для нахождения соотношения между радиусами рассмотрим прямоугольный треугольник SHC . Точка M – середина гипотенузы SC , на катете SH находится точка O , причём $SO = CO = R$, $OH = OM = r$. Треугольники CHO, CMO и SMO равны по катету и гипотенузе, следовательно, $CH = CM = SM$. Значит, $CH = \frac{1}{2} SM$, $\angle HSC = 30^\circ$. Тогда из треугольника SOM находим, что $r : R = 1 : 2$.

в) $SC = 2CH = BC = 4$, поэтому треугольник SBC – равносторонний, $SH = SB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$. Пусть F – середина ребра AB . Тогда $\angle SFH = \arctg 2$ (угол SFH является углом между гранями SAB и ABC , т.к. $HF \perp AB, SF \perp AB$). Тогда $HF = SH \cdot \operatorname{ctg} \angle SFH = 2\sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = \sqrt{3}$, $AC = 2 \cdot FH = 2\sqrt{3}$. По теореме Пифагора для треугольника ABC находим, что $AB = 2$, поэтому $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3}$; объём пирамиды V равен $\frac{1}{3} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 2\sqrt{3} = 4$.

8. Дан правильный 24-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 45° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 384.

Решение. Опишем вокруг 24-угольника окружность. Будем считать, что длина окружности равна 24 (тогда длина дуги между соседними вершинами равна 1). Вписанный угол в 45 градусов опирается на дугу длиной 6. Значит, для данной вершины A найдутся $24 - 6 - 1 = 17$ (неупорядоченных) пар вершин (B, C) , для которых $\angle BAC = 45^\circ$. Суммируя по всем вершинам, получаем $17 \cdot 24 = 408$ троек вершин. При таком подсчёте дважды учтены 24 равнобедренных треугольников с углами $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ (положение равнобедренного треугольника однозначно определяется положением его вершины), поэтому в итоге получаем $408 - 24 = 384$ способа расположения точек.

БИЛЕТ 3

1. Решите уравнение $\log_{(2^x)}(x^2 - 6x - 15) + \log_{(8^x)}(x^3) = \frac{3}{x}$.

Ответ: $x = 8$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{1}{x} \log_2(x^2 - 6x - 15) + \frac{3}{3x} \log_2 x = \frac{3}{x} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2(x^2 - 6x - 15) + \log_2 x = 3, \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2(x^3 - 6x^2 - 15x) = \log_2 8, \\ x > 0 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 6x^2 - 15x - 8 = 0, \\ x > 0 \end{cases}$$

Одним из корней кубического уравнения является $x = -1$. Разделив уголком на $x + 1$, получаем уравнение $(x + 1)(x^2 - 7x - 8) = 0$, откуда $x = -1$ или $x = 8$. В ОДЗ входит только корень $x = 8$.

2. Решите неравенство $\frac{1}{\sqrt{|x+2|-1}} \leq \frac{1}{5+x}$.

Ответ: $x \in (-5; -4]$.

Решение.

1-й способ. Переносим в одну часть и приводим дроби к общему знаменателю: $\frac{\sqrt{|x+2|-1} - 5 - x}{(5+x)\sqrt{|x+2|-1}} \geq 0$.

Находим нули знаменателя: $5 + x = 0 \Leftrightarrow x = -5$; $\sqrt{|x+2|-1} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3, \\ x = -1. \end{cases}$

Находим нули числителя: $\sqrt{|x+2|-1} - 5 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 5 \geq 0, \\ |x+2|-1 = (x+5)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -5, \\ \begin{cases} x + 2 = 1 + (x+5)^2, \\ x + 2 = -1 - (x+5)^2. \end{cases} \end{cases}$

Первое уравнение совокупности не имеет решений, а из второго находим, что $x = -7$ или $x = -4$. Неравенству $x \geq -5$ удовлетворяет только $x = -4$, т.е. числитель обращается в ноль только при $x = -4$.

Находим ОДЗ: $|x+2|-1 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -3) \cup (-1; +\infty)$.

Далее решаем методом интервалов: из каждого промежутка, принадлежащего ОДЗ, подставляем какое-либо значение x и определяем знак левой части в этой точке. В итоге промежутки $(-\infty; -5)$, $(-4; -3)$ и $(-1; +\infty)$ не подходят, а промежуток $(-5; -4)$ – подходит. Также не забываем включить в ответ точку $x = -4$ – ноль числителя.

2-й способ. При отрицательной правой части решений нет, поэтому $x + 5 > 0$. Умножаем обе части неравенства на *положительное* выражение $(x+5)\sqrt{|x+2|-1}$ и получаем неравенство $\sqrt{|x+2|-1} \geq x + 5$, равносильное исходному. Поскольку правая часть больше нуля, возведение в квадрат является равносильным преобразованием. Получаем

$$|x+2|-1 \geq x^2 + 10x + 25 \Leftrightarrow |x+2| \geq x^2 + 10x + 26 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2 \geq x^2 + 10x + 26, \\ x + 2 \leq -x^2 - 10x - 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 9x + 24 \leq 0, \\ x^2 + 11x + 28 \leq 0. \end{cases}$$

Первое неравенство совокупности не имеет решений, а из второго получаем, что $x \in [-7; -4]$. Учитывая ограничение $x + 5 > 0$, окончательно находим $x \in (-5; -4]$.

3. Решите уравнение $\sqrt{6 + \frac{22}{3} \sin^2 x} = 3 \cos x + \frac{2}{\sqrt{3}} \sin x$.

Ответ: $x = \arctg \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\pi k$, $x = -\arctg \frac{\sqrt{3}}{6} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению

$$6 + \frac{22}{3} \sin^2 x = \frac{4 \sin^2 x}{3} + 4\sqrt{3} \sin x \cos x + 9 \cos^2 x \quad (*)$$

при условии $\frac{2 \sin x}{\sqrt{3}} + 3 \cos x \geq 0$. Используя основное тригонометрическое тождество

($6 \rightarrow 6 \cos^2 x + 6 \sin^2 x$) и приводя подобные слагаемые, получаем: $3 \cos^2 x + 4\sqrt{3} \sin x \cos x - 12 \sin^2 x = 0$.

Подстановкой убеждаемся, что при $\sin x = 0$ решений нет. Если разделить обе части на $\sqrt{3} \sin^2 x$, то выходит квадратное уравнение относительно $\operatorname{ctg} x$: $\sqrt{3} \operatorname{ctg}^2 x + 4 \operatorname{ctg} x - 4\sqrt{3} = 0$, решая которое, находим,

что $\operatorname{ctg} x = -2\sqrt{3}$ или $\operatorname{ctg} x = \frac{2}{\sqrt{3}}$. Следовательно, $x = -\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{6} + \pi k$ или $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Условию $\frac{2 \sin x}{\sqrt{3}} + 3 \cos x \geq 0$ удовлетворяют только значения $x = -\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{6} + 2\pi k$ и $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{2} + 2\pi k$.

Примечание. Уравнение (*) с помощью формул понижения степени и двойного угла можно также преобразовать к виду $5\sqrt{3} \cos 2x + 4 \sin 2x = 3\sqrt{3}$. Если далее решать это уравнение, вводя вспомогательный угол, то ответ может быть получен, например, в таком виде:

$$(a) \quad x = \frac{1}{2} \arccos \frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{91}} \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{91}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \text{ или}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \arcsin \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{91}} - \frac{1}{2} \arccos \frac{4}{\sqrt{91}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{91}} - \frac{1}{2} \arccos \frac{4}{\sqrt{91}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

4. Число 94850 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 9485094850948509485094850948509485094850948509485094850948509485094850. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 216.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 15, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 3 и на 5. Для делимости на 5 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0 или 5. Значит, полученное число будет делиться на 5, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 4 на 1, цифры 9 на 0, а цифры 8 и 5 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 01220012200122001220012200122001220$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 35. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две единицы, либо б) двойку и ноль. Количество способов вычеркнуть две единицы равно $C_7^2 = 21$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну двойку равно $C_{14}^1 \cdot C_{14}^1 = 14 \cdot 14 = 196$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $196 + 21 - 1 = 216$ способов.

5. В параллелограмме $ABCD$ угол ABC равен $\arcsin \frac{\sqrt{15}}{4}$. Окружность Ω , проходящая через точки A , B и C , пересекает стороны AD и CD в точках P и M соответственно, причём $AP = 3$, $CM = 6$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

Ответ: $S = 20\sqrt{15}$, $R = \frac{4\sqrt{31}}{\sqrt{15}}$.

Решение. Трапеция $BCMA$ вписана в окружность, поэтому она равнобокая, $CB = MA$. Противоположные стороны параллелограмма равны: $BC = AD$. Следовательно, $MA = AD$, поэтому треугольник ADM

равнобедренный. $\angle ADM = \angle ABC = \arcsin \frac{\sqrt{15}}{4} = \arccos \frac{1}{4}$. Пусть AH – высота треугольника ADM . Тогда

$$\frac{1}{4} = \cos \angle ADH = \frac{DH}{AD} = \frac{DM}{2AD}. \text{ Если обозначить } DM = x, \text{ то } AD = 2x.$$

Из точки D к окружности проведены секущие DMC и DPA . По теореме о двух секущих получаем, что $DM \cdot DC = DP \cdot DA$, т.е. $x(x+6) = (2x-3) \cdot 2x$, откуда $x = 4$. Значит, $CD = 10$, $AD = 8$. Поэтому площадь S параллелограмма $ABCD$ равна $AB \cdot BC \cdot \sin \angle ABC = 10 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = 20\sqrt{15}$.

Окружность Ω является описанной около треугольника ABC . Её радиус R равен $\frac{AC}{2 \sin \angle ABC}$. Сто-
рону AC находим по теореме косинусов из треугольника ABC : $AC^2 = 64 + 100 - 2 \cdot 10 \cdot 8 \cdot \frac{1}{4} = 124$. По-
этому $BD = 2\sqrt{31}$, а $R = 2\sqrt{31} : \frac{2\sqrt{15}}{4} = \frac{4\sqrt{31}}{\sqrt{15}}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (2x^2 + 3xy + 2y^2)(49 - x^2) \leq 0, \\ |x + 3 + y| + |x + 3 - y| \leq a? \end{cases}$$

Ответ: $6 \leq a < 8$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = 2x^2 + 3xy + 2y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = 9y^2 - 16y^2 = -7y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = 2x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, первое неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} 2x^2 + 3xy + 2y^2 = 0, \\ 49 - x^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x \in (-\infty; -7] \cup [7; +\infty). \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $x = -7$ и левее неё, точки на прямой $x = 7$ и правее неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём ко второму неравенству. Проведём на координатной плоскости прямые $x + 3 + y = 0$ и $x + 3 - y = 0$. Они разбивают плоскость на 4 области, в каждой из которых знаки выражений под модулями постоянны. Рассматриваем 4 случая.

Если $x + 3 + y \geq 0$ и $x + 3 - y \geq 0$, то неравенство принимает вид $x + 3 + y + x + 3 - y \leq a \Leftrightarrow x \leq -3 + \frac{a}{2}$.

Аналогично, если $x + 3 + y < 0$ и $x + 3 - y \geq 0$, то $-x - 3 - y + x + 3 - y \leq a \Leftrightarrow y \geq -\frac{a}{2}$.

Если $x + 3 + y < 0$ и $x + 3 - y < 0$, то $-x - 3 - y - x - 3 + y \leq a \Leftrightarrow x \geq -3 - \frac{a}{2}$.

Если $x + 3 + y \geq 0$ и $x + 3 - y < 0$, то $x + 3 + y - x - 3 + y \leq a \Leftrightarrow y \leq \frac{a}{2}$.

Окончательно получаем, что при $a = 0$ неравенство задаёт точку $(-3; 0)$, при $a > 0$ – квадрат с центром в точке $(-3; 0)$ и стороной a , а при $a < 0$ – пустое множество.

Очевидно, при $a \leq 0$ система не имеет решений. При $a > 0$ для того, чтобы было единственное решение, нужно, чтобы точка $(0; 0)$ попадала в квадрат, но чтобы квадрат не пересекал прямую $x = -7$, откуда

следует, что $3 \leq \frac{a}{2} < 4$, т.е. $6 \leq a < 8$.

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что $\angle SAB = \arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: а) 0; б) 1:2; в) $\frac{1}{2}$.

Решение. Пусть O – центр сферы ω ; K, L, M – основания перпендикуляров, опущенных из точки O на рёбра AS, BS, CS соответственно; SH – высота пирамиды $SABC$; r и R – радиусы сфер ω и Ω соответственно.

а) Поскольку точка O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AS , она равноудалена от концов этого отрезка, т.е. $OA = OS$. Аналогично $OB = OS$ и $OC = OS$. Значит, $OA = OB = OC = OS$, поэтому точка O является центром сферы Ω . Следовательно, расстояние между центрами сфер равно нулю.

б) Из равенства прямоугольных треугольников SOK, SOL и SOM ($OK = OL = OM = r$, OS – общая сторона) следует, что $SK = SL = SM$. Поскольку точки K, L, M – это середины боковых рёбер пирамиды, отсюда получаем, что боковые рёбра равны между собой. Тогда высота пирамиды проходит через центр окружности, описанной около основания (действительно, $\Delta SHA = \Delta SHB = \Delta SHC$ по катету и гипотенузе, откуда $AH = BH = CH$). Но в пирамиде $OABC$ боковые рёбра OA, OB, OC также равны между собой как радиусы сферы Ω ; значит, и её высота, проведённая из вершины O проходит через центр окружности, описанной около основания. Таким образом, высота пирамиды SH проходит через точку O . Кроме того, точка H является центром окружности, описанной около основания. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, H – это середина гипотенузы BC . Так как отрезок OH перпендикулярен плоскости основания, он равен радиусу r сферы ω .

Для нахождения соотношения между радиусами рассмотрим прямоугольный треугольник SHC . Точка M – середина гипотенузы SC , на катете SH находится точка O , причём $SO = CO = R$, $OH = OM = r$. Треугольники CHO, CMO и SOM равны по катету и гипотенузе, следовательно, $CH = CM = SM$. Значит, $CH = \frac{1}{2}SM$, $\angle HSC = 30^\circ$. Тогда из треугольника SOM находим, что $r : R = 1 : 2$.

в) $SC = 2CH = BC = 2$, поэтому треугольник SBC – равносторонний, $SH = SB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$. В равнобедренном треугольнике SAB известны боковые стороны $SB = SA = 2$ и угол при основании $\angle SAB = \arccos \frac{\sqrt{3}}{4}$. Отсюда находим, что $AB = 2SA \cdot \cos \angle SAB = \sqrt{3}$. По теореме Пифагора для треугольника ABC находим, что $AC = 1$, поэтому $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \sqrt{3}$; объём пирамиды V равен $\frac{1}{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{2}$.

8. Дан правильный 30-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 30° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 690.

Решение. Опишем вокруг 30-угольника окружность. Будем считать, что длина окружности равна 30 (тогда длина дуги между соседними вершинами равна 1). Вписанный угол в 30 градусов опирается на дугу длиной 5. Значит, для данной вершины A найдутся $30 - 5 - 1 = 24$ (неупорядоченных) пары вершин (B, C) , для которых $\angle BAC = 30^\circ$. Суммируя по всем вершинам, получаем $30 \cdot 24 = 720$ троек вершин. При таком подсчёте дважды учтены 30 равнобедренных треугольников с углами $30^\circ, 30^\circ, 120^\circ$ (положение равнобедренного треугольника однозначно определяется положением его вершины), поэтому в итоге получаем $720 - 30 = 690$ способов расположения точек.

БИЛЕТ 4

1. Решите уравнение $\log_{(5^{x-1})}(x^2 - 7x + 11) + \log_{(125^{x-1})}(x^3) = \frac{1}{x-1}$.

Ответ: $x = 5$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{1}{x-1} \log_5(x^2 - 7x + 11) + \frac{3}{3(x-1)} \log_5 x = \frac{1}{x-1} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_5(x^2 - 7x + 11) + \log_5(x) = 1, \\ x - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \log_3(x^3 - 7x^2 + 11x) = \log_5 5, \\ x \neq 1, \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 7x^2 + 11x - 5 = 0, \\ x \neq 1, \\ x > 0. \end{cases}$$

Одним из корней кубического уравнения является $x = 1$. Разделив уголок на $x - 1$, получаем уравнение $(x - 1)(x^2 - 6x + 5) = 0$, откуда $x = 1$ или $x = 5$. В ОДЗ входит только корень $x = 5$.

2. Решите неравенство $\frac{1}{\sqrt{|x+3|-2}} \leq \frac{1}{7+x}$.

Ответ: $x \in (-7; -6]$.

Решение.

1-й способ. Переносим в одну часть и приводим дроби к общему знаменателю: $\frac{\sqrt{|x+3|-2} - 7 - x}{(7+x)\sqrt{|x+3|-2}} \geq 0$.

Находим нули знаменателя: $7 + x = 0 \Leftrightarrow x = -7$; $\sqrt{|x+3|-2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5, \\ x = -1. \end{cases}$

Находим нули числителя: $\sqrt{|x+3|-2} - 7 - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x + 7 \geq 0, \\ |x+3|-2 = (x+7)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq -7, \\ x+3 = 2 + (x+7)^2, \\ x+3 = -2 - (x+7)^2. \end{cases}$

Первое уравнение совокупности не имеет решений, а из второго находим, что $x = -6$ или $x = -9$. Неравенству $x \geq -7$ удовлетворяет только $x = -6$, т.е. числитель обращается в ноль только при $x = -6$.

Находим ОДЗ: $|x+3|-2 > 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; -5) \cup (-1; +\infty)$.

Далее решаем методом интервалов: из каждого промежутка, принадлежащего ОДЗ, подставляем какое-либо значение x и определяем знак левой части в этой точке. В итоге промежутки $(-\infty; -7)$, $(-6; -5)$ и $(-1; +\infty)$ не подходят, а промежуток $(-7; -6)$ – подходит. Также не забываем включить в ответ точку $x = -6$ – ноль числителя.

2-й способ. При отрицательной правой части решений нет, поэтому $x + 7 > 0$. Умножаем обе части неравенства на *положительное* выражение $(x+7)\sqrt{|x+3|-2}$ и получаем неравенство $\sqrt{|x+3|-2} \geq x+7$, равносильное исходному. Поскольку правая часть больше нуля, возведение в квадрат является равносильным преобразованием. Получаем

$$|x+3|-2 \geq x^2 + 14x + 49 \Leftrightarrow |x+3| \geq x^2 + 14x + 51 \Leftrightarrow \begin{cases} x+3 \geq x^2 + 14x + 51, \\ x+3 \leq -x^2 - 14x - 51 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + 13x + 48 \leq 0, \\ x^2 + 15x + 54 \leq 0. \end{cases}$$

Первое неравенство совокупности не имеет решений, а из второго получаем, что $x \in [-9; -6]$. Учитывая ограничение $x + 7 > 0$, окончательно находим $x \in (-7; -6]$.

3. Решите уравнение $\sqrt{3 + \frac{25}{2} \sin^2 x} = \sqrt{6} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x$.

Ответ: $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$, $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{5} + 2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению

$$3 + \frac{25}{2} \sin^2 x = \frac{\sin^2 x}{2} - 2\sqrt{3} \sin x \cos x + 6 \cos^2 x \quad (*)$$

при условии $\sqrt{6} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \geq 0$. Используя основное тригонометрическое тождество

($3 \rightarrow 3 \cos^2 x + 3 \sin^2 x$) и приводя подобные слагаемые, получаем: $3 \cos^2 x - 2\sqrt{3} \sin x \cos x - 15 \sin^2 x = 0$.

Подстановкой убеждаемся, что при $\sin x = 0$ решений нет. Если разделить обе части на $\sqrt{3} \sin^2 x$, то выходит квадратное уравнение относительно $\operatorname{ctg} x$: $\sqrt{3} \operatorname{ctg}^2 x - 2 \operatorname{ctg} x - 5\sqrt{3} = 0$, решая которое, находим,

что $\operatorname{ctg} x = \frac{5}{\sqrt{3}}$ или $\operatorname{ctg} x = -\sqrt{3}$. Следовательно, $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{5} + \pi k$ или $x = -\frac{\pi}{6} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Условию $\sqrt{6} \cos x - \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \geq 0$ удовлетворяют только значения $x = \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{3}}{5} + 2\pi k$ и $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k$.

Примечание. Уравнение (*) с помощью формул понижения степени и двойного угла можно также преобразовать к виду $3\sqrt{3} \cos 2x - \sin 2x = 2\sqrt{3}$. Если далее решать это уравнение, вводя вспомогательный угол, то ответ может быть получен, например, в таком виде:

$$(a) \quad x = -\frac{1}{2} \arccos \frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{7}} \pm \frac{1}{2} \arccos \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z} \quad \text{или}$$

$$(b) \quad \begin{cases} x = \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2\sqrt{7}} - \frac{1}{2} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}, \\ x = -\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \arccos \frac{1}{2\sqrt{7}} + \frac{1}{2} \arcsin \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{7}} + 2\pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

4. Число 83105 написали 7 раз подряд, при этом получилось 35-значное число 83105831058310583105831058310583105831058310583105. Из этого 35-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 33-значное число делилось на 15. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 216.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 15, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 3 и на 5. Для делимости на 5 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0 или 5. Значит, полученное число будет делиться на 5, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 3 на 0, а цифры 8 и 5 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 20102201022010220102201022010220102$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 35. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две единицы, либо б) двойку и ноль. Количество способов вычеркнуть две единицы равно $C_7^2 = 21$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну двойку равно $C_{14}^1 \cdot C_{14}^1 = 14 \cdot 14 = 196$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $196 + 21 - 1 = 216$ способов.

5. В параллелограмме $ABCD$ угол BAD равен $\operatorname{arctg} \sqrt{15}$. Окружность Ω , проходящая через точки A , B и D , пересекает стороны BC и CD в точках F и N соответственно, причём $BF = 7$, $DN = 1$. Найдите площадь параллелограмма $ABCD$ и радиус окружности Ω .

$$\text{Ответ: } S = 15\sqrt{15}, \quad R = \frac{2\sqrt{106}}{\sqrt{15}}.$$

Решение. Трапеция $ABFD$ вписана в окружность, поэтому она равнобокая, $AB = FD$. Противоположные стороны параллелограмма равны: $AB = CD$. Следовательно, $FD = CD$, поэтому треугольник FCD

равнобедренный. $\angle DCF = \angle BAD = \arctg \sqrt{15} = \arccos \frac{1}{4} = \arcsin \frac{\sqrt{15}}{4}$. Пусть DH – высота треугольника DFC . Тогда $\frac{1}{4} = \cos \angle DCH = \frac{CH}{CD} = \frac{CF}{2CD}$. Если обозначить $FC = x$, то $CD = 2x$.

Из точки C к окружности проведены секущие CND и CFB . По теореме о двух секущих получаем $CF \cdot CB = CN \cdot CD$, т.е. $x(x+7) = (2x-1) \cdot 2x$, откуда $x = 3$. Отсюда следует, что $BC = 10$, $CD = 6$. Значит, площадь S параллелограмма $ABCD$ равна $CB \cdot CD \cdot \sin \angle BCD = 10 \cdot 6 \cdot \frac{\sqrt{15}}{4} = 15\sqrt{15}$.

Окружность Ω является описанной около треугольника BDA . Её радиус R равен $\frac{BD}{2 \sin \angle BAD}$. Сторону BD находим по теореме косинусов из треугольника BDA : $BD^2 = 36 + 100 - 2 \cdot 10 \cdot 6 \cdot \frac{1}{4} = 106$. Поэтому $BD = \sqrt{106}$, а $R = \sqrt{106} : \frac{2\sqrt{15}}{4} = \frac{2\sqrt{106}}{\sqrt{15}}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе неравенств

$$\begin{cases} (2x^2 + 4xy + 3y^2)(64 - y^2) \leq 0, \\ |x - 3 + y| + |y - 3 - x| \leq a? \end{cases}$$

Ответ: $6 \leq a < 10$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = 2x^2 + 4xy + 3y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = 16y^2 - 24y^2 = -8y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = 2x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, первое неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} 2x^2 + 4xy + 3y^2 = 0, \\ 64 - y^2 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \in (-\infty; -8] \cup [8; +\infty). \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = -8$ и ниже неё, точки на прямой $y = 8$ и выше неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём ко второму неравенству. Проведём на координатной плоскости прямые $x - 3 + y = 0$ и $y - 3 - x = 0$. Они разбивают плоскость на 4 области, в каждой из которых знаки выражений под модулями постоянны. Рассматриваем 4 случая.

Если $x - 3 + y \geq 0$ и $y - 3 - x \geq 0$, то неравенство принимает вид $x - 3 + y + y - 3 - x \leq a \Leftrightarrow y \leq 3 + \frac{a}{2}$.

Аналогично, если $x - 3 + y < 0$ и $y - 3 - x \geq 0$, то $-x + 3 - y + y - 3 - x \leq a \Leftrightarrow x \geq -\frac{a}{2}$.

Если $x - 3 + y < 0$ и $y - 3 - x < 0$, то $-x + 3 - y - y + 3 + x \leq a \Leftrightarrow y \geq 3 - \frac{a}{2}$.

Если $x - 3 + y \geq 0$ и $y - 3 - x < 0$, то $x - 3 + y - y + 3 + x \leq a \Leftrightarrow x \leq \frac{a}{2}$.

Окончательно получаем, что при $a = 0$ неравенство задаёт точку $(0; 3)$, при $a > 0$ – квадрат с центром в точке $(0; 3)$ и стороной a , а при $a < 0$ – пустое множество.

Очевидно, при $a \leq 0$ система не имеет решений. При $a > 0$ для того, чтобы было единственное решение, нужно, чтобы точка $(0; 0)$ попадала в квадрат, но чтобы квадрат не пересекал прямую $y = 8$, откуда следует, что $3 \leq \frac{a}{2} < 5$, т.е. $6 \leq a < 10$.

7. В основании треугольной пирамиды $SABC$ лежит прямоугольный треугольник ABC с гипотенузой $BC = 2\sqrt{3}$. Сфера ω касается плоскости основания пирамиды и касается всех трёх её боковых рёбер в их серединах. Пусть Ω – сфера, описанная около пирамиды $SABC$.

а) Найдите расстояние между центрами сфер ω и Ω .

б) Найдите отношение радиусов сфер ω и Ω .

в) Пусть дополнительно известно, что угол между гранями SAB и ABC равен $\arctg(2\sqrt{3})$. Найдите объём пирамиды $SABC$.

Ответ: а) 0; б) 1:2; в) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Решение. Пусть O – центр сферы ω ; K, L, M – основания перпендикуляров, опущенных из точки O на рёбра AS, BS, CS соответственно; SH – высота пирамиды $SABC$; r и R – радиусы сфер ω и Ω соответственно.

а) Поскольку точка O лежит на серединном перпендикуляре к отрезку AS , она равноудалена от концов этого отрезка, т.е. $OA = OS$. Аналогично $OB = OS$ и $OC = OS$. Значит, $OA = OB = OC = OS$, поэтому точка O является центром сферы Ω . Следовательно, расстояние между центрами сфер равно нулю.

б) Из равенства прямоугольных треугольников SOK, SOL и SOM ($OK = OL = OM = r, OS$ – общая сторона) следует, что $SK = SL = SM$. Поскольку точки K, L, M – это середины боковых рёбер пирамиды, отсюда получаем, что боковые рёбра равны между собой. Тогда высота пирамиды проходит через центр окружности, описанной около основания (действительно, $\Delta SHA = \Delta SHB = \Delta SHC$ по катету и гипотенузе, откуда $AH = BH = CH$). Но в пирамиде $OABC$ боковые рёбра OA, OB, OC также равны между собой как радиусы сферы Ω ; значит, и её высота, проведённая из вершины O проходит через центр окружности, описанной около основания. Таким образом, высота пирамиды SH проходит через точку O . Кроме того, точка H является центром окружности, описанной около основания. Поскольку треугольник ABC прямоугольный, H – это середина гипотенузы BC . Так как отрезок OH перпендикулярен плоскости основания, он равен радиусу r сферы ω .

Для нахождения соотношения между радиусами рассмотрим прямоугольный треугольник SHC . Точка M – середина гипотенузы SC , на катете SH находится точка O , причём $SO = CO = R, OH = OM = r$. Треугольники CHO, CMO и SMO равны по катету и гипотенузе, следовательно, $CH = CM = SM$. Значит, $CH = \frac{1}{2}SM, \angle HSC = 30^\circ$. Тогда из треугольника SOM находим, что $r : R = 1 : 2$.

в) $SC = 2CH = BC = 2\sqrt{3}$, поэтому треугольник SBC – равносторонний, $SH = SB \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 3$. Пусть F – середина ребра AB . Тогда $\angle SFH = \arctg(2\sqrt{3})$ (угол SFH является углом между гранями SAB и ABC , т.к. $HF \perp AB, SF \perp AB$). Тогда $HF = SH \cdot \operatorname{ctg} \angle SFH = 3 \cdot \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{2}, AC = 2 \cdot FH = \sqrt{3}$. По теореме Пифагора для треугольника ABC находим, что $AB = 3$, поэтому $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot \sqrt{3}$; объём пирамиды V равен $\frac{1}{3} \cdot \frac{3\sqrt{3}}{2} \cdot 3 = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

8. Дан правильный 36-угольник. Найдите количество троек его вершин, являющихся вершинами треугольника, в котором хотя бы один угол равен 45° . (Две тройки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 900.

Решение. Опишем вокруг 36-угольника окружность. Будем считать, что длина окружности равна 36 (тогда длина дуги между соседними вершинами равна 1). Вписанный угол в 45 градусов опирается на дугу длиной 9. Значит, для данной вершины A найдутся $36 - 9 - 1 = 26$ (неупорядоченных) пар вершин (B, C) , для которых $\angle BAC = 30^\circ$. Суммируя по всем вершинам, получаем $36 \cdot 26 = 936$ троек вершин. При таком подсчёте дважды учтены 36 равнобедренных треугольников с углами $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$ (положение равнобедренного треугольника однозначно определяется положением его вершины), поэтому в итоге получаем $936 - 36 = 900$ способов расположения точек.

БИЛЕТ 5

1. Решите уравнение $\log_{(6^{x-2})}(x^2) + \log_{(36^{x-2})}((x-5)^4) = \frac{2}{x-2}$.

Ответ: $x = 3, x = -1, x = 6$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{2}{x-2} \log_6 |x| + \frac{4}{2(x-2)} \log_6 |x-5| = \frac{2}{x-2} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_6 |x| + \log_6 |x-5| = 1, \\ x-2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_6 |x^2 - 5x| = \log_6 6, \\ x \neq 2. \end{cases}$$

Уравнение $|x^2 - 5x| = 6$ эквивалентно совокупности двух уравнений $x^2 - 5x = -6$ и $x^2 - 5x = 6$, решая которые, находим, что $x = 2, x = 3, x = -1, x = 6$. Значение $x = 2$ не входит в ОДЗ.

2. Решите уравнение $2\sqrt{7} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{27 + \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right)}$.

Ответ: $x = 2\pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению $27 + \sin\left(3x + \frac{\pi}{2}\right) = 28 \sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$ при условии $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$. С помощью формул приведения, формул понижения степени и формулы косинуса тройного угла получаем:

$$27 + \cos 3x = 14 - 14 \cos(x - \pi), \quad 13 + 4 \cos^3 x - 3 \cos x = 14 \cos x, \quad 4 \cos^3 x - 17 \cos x + 13 = 0.$$

Обозначая $\cos x = y$ ($|y| \leq 1$), получаем уравнение $4y^3 - 17y + 13 = 0$, одним из корней которого является $y = 1$. После деления на $(y - 1)$ остаётся уравнение $4y^2 + 4y - 13 = 0$. Его корни $\left(y = \frac{-1 \pm \sqrt{14}}{2}\right)$ по модулю больше единицы, следовательно, они не подходят.

Если $y = 1$, то $\cos x = 1, x = 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Подставляя найденные x в неравенство $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$, получаем $\sin\left(\pi m - \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$. Несложно видеть, что подходят только нечётные значения m , т.е. $m = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$, откуда $x = 2\pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

3. Решите неравенство $\left(\frac{6|x-2|}{x^2+21}\right)^{x+\sqrt{x^2-6}} > 1$.

Ответ: $x \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\sqrt{6}]$.

Решение. Запишем неравенство в виде $\left(\frac{6|x-2|}{x^2+21}\right)^{x+\sqrt{x^2-6}} > \left(\frac{6|x-2|}{x^2+21}\right)^0$. Обозначим $f(x) = \frac{6|x-2|}{x^2+21}$. Несложно видеть, что $f(x)$ положительна при всех x из ОДЗ (значение $x = 2$ не входит в ОДЗ). Рассмотрим разность $f(x) - 1 = \frac{6|x-2| - x^2 - 21}{x^2 + 21}$.

При $x \geq 2$ она принимает вид $\frac{6x - 12 - x^2 - 21}{x^2 + 21} = \frac{-x^2 + 6x - 33}{x^2 + 21} = \frac{-(x-3)^2 - 24}{x^2 + 21}$. Если $x < 2$, то получаем $\frac{12 - 6x - x^2 - 21}{x^2 + 21} = \frac{-x^2 - 6x - 9}{x^2 + 21} = -\frac{(x+3)^2}{x^2 + 21}$. Таким образом, рассматриваемая разность отрицательна при всех x , отличных от -3 . Отсюда следует, что $f(x) < 1$ при всех x , кроме $x = -3$.

Подстановкой убеждаемся, что $x = -3$ решением не является.

При всех остальных x неравенство равносильно каждому из следующих:

$$x + \sqrt{x^2 - 6} < 0, \sqrt{x^2 - 6} < -x, \begin{cases} -x > 0, \\ x^2 - 6 \geq 0, \\ x^2 - 6 < x^2, \end{cases} \quad x \leq -\sqrt{6}.$$

Исключая значение $x = -3$, получаем $x \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\sqrt{6}]$.

4. Число 58964 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 589645896458964589645896458964589645896458964. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 247.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 6, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 2 и на 3. Для делимости на 2 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0, 2, 4, 6 или 8. Значит, полученное число будет делиться на 2, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 4 на 1, цифры 9 и 6 на 0, а цифры 5 и 8 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 220012200122001220012200122001220012200122001$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 40. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две двойки, либо б) единицу и ноль. Количество способов вычеркнуть две двойки равно $C_{16}^2 = 120$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну единицу равно $C_{16}^1 \cdot C_8^1 = 16 \cdot 8 = 128$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $128 + 120 - 1 = 247$ способов.

5. Дана прямоугольная трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle BCD = 90^\circ$. Точка M – середина отрезка CD . Известно, что окружность радиуса 5 проходит через точки A и B и касается стороны CD в точке M , а $\cos \angle BMC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Найдите длины отрезков AB и BC , а также площадь трапеции.

Ответ: $AB = 10$; $BC = \frac{10}{9}$; $S = \frac{200\sqrt{2}}{9}$.

Решение. Поскольку окружность касается CD , её центр O лежит на перпендикуляре к CD в точке M . С другой стороны, O лежит на серединном перпендикуляре к AB . Эти две прямые пересекаются в середине AB . Значит, O – середина AB , и AB – диаметр окружности, откуда $AB = 2R = 10$.

Обозначим $\angle BMC = \varphi$. Тогда дуга BM равна 2φ (теорема об угле между касательной и хордой), а $\angle BAM = \varphi$ (теорема о вписанном угле). Далее находим, что $\angle BMA = 90^\circ$ (опирается на диаметр), $\angle DAM = 90^\circ - \angle DMA = 90^\circ - (180^\circ - \angle BMA - \angle BMC) = \varphi$. Значит, прямоугольные треугольники AMB , ADM и MCB подобны.

Вычисляем основания и высоту трапеции: $BM = AB \sin \varphi = \frac{10}{3}$, $BC = BM \sin \varphi = \frac{10}{9}$,
 $DM = CM = BM \cos \varphi = \frac{20\sqrt{2}}{9}$, $AD = MD \operatorname{ctg} \varphi = \frac{80}{9}$. Тогда площадь трапеции S равна
 $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{10}{9} + \frac{80}{9} \right) \cdot \frac{40\sqrt{2}}{9} = \frac{200\sqrt{2}}{9}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (x^2 - xy + y^2)(|x - y| - 6) \geq 0, \\ x(x + 2) + y(y - 2) = a? \end{cases}$$

Ответ: $a = 0$; $a = 6$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = x^2 - xy + y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = y^2 - 4y^2 = -3y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} x^2 - xy + y^2 = 0, \\ |x - y| \geq 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x - y \geq 6, \\ x - y \leq -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \leq x - 6, \\ y \geq x + 6. \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = x + 6$ и выше неё, точки на прямой $y = x - 6$ и ниже неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём к уравнению $x(x+2) + y(y-2) = a$. Преобразуем левую часть, выделяя полные квадраты, и получаем $(x+1)^2 + (y-1)^2 = a+2$. При $a < -2$ это уравнение задаёт пустое множество, при $a = -2$ – точку $T(-1; 1)$, а при $a > -2$ – окружность с центром в точке $T(-1; 1)$ радиуса $\sqrt{a+2}$.

Очевидно, при $a \leq -2$ система не имеет решений. При $a > -2$ единственное решение возможно в двух случаях: окружность проходит через точку $K(0; 0)$ или окружность касается прямой $y = x + 6$. В первом случае радиус окружности должен быть равен длине отрезка TK , т.е. $\sqrt{a+2} = \sqrt{2}$, откуда $a = 0$. Во втором случае радиус равен расстоянию от точки T до прямой $x - y + 6 = 0$, т.е. $\sqrt{a+2} = \frac{|-1-1+6|}{\sqrt{1+1}}$, откуда $a = 6$.

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $CP : PC_1$, если $BN : NB_1 = 3 : 4$.

Ответ: $AK : KA_1 = 3 : 25$, $CP : PC_1 = 27 : 1$ или $AK : KA_1 = 27 : 1$, $CP : PC_1 = 3 : 25$.

Решение. Пусть, для определённости, ABC – нижнее основание призмы. Пусть α касается нижнего и верхнего оснований цилиндра в точках X и X_1 соответственно. Из симметрии, XX_1 пересекает ось цилиндра. Обозначив через X' проекцию точки X на нижнее основание; тогда XX' – диаметр нижнего основания.

Пусть K' , N' , P' – проекции точек K , N , P на осевое сечение цилиндра, содержащее XX_1 (тогда они лежат на XX_1), а A' , B' , C' – проекции точек A , B , C на XX' . Поскольку A , B , C – проекции точек K , N , P на нижнее основание, получаем, что A' , B' , C' также являются проекциями K , N , P (а также K' , N' , P') на XX' . Значит, $\frac{AK}{KA_1} = \frac{XK'}{K'X_1} = \frac{XA'}{A'X'}$ и, аналогично, $\frac{BN}{NB_1} = \frac{XB'}{B'X'}$ и $\frac{CP}{PC_1} = \frac{XC'}{C'X'}$.

Пусть теперь O – центр нижнего основания, и $\angle XO'B = \varphi$. Без ограничения общности можно считать, что радиус нижнего основания равен 1. Тогда $XB' = 1 - \cos \varphi$. Поскольку $\angle AOB = \angle BOC = \frac{2\pi}{3}$, аналогично

получаем, что длины отрезков XA' и XC' равны $1 - \cos\left(\varphi \pm \frac{2\pi}{3}\right)$.

Из условия получаем $XB' = 2 \cdot \frac{3}{3+4}$, значит, $\cos \varphi = \frac{1}{7}$. Тогда $\sin \varphi = \frac{4\sqrt{3}}{7}$, откуда

$$\cos\left(\varphi + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} - \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{13}{14} \text{ и}$$

$$\cos\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} + \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{1}{7} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{4\sqrt{3}}{7} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{11}{14}.$$

Значит, один из отрезков XA' и XC' равен $\frac{27}{14}$, а другой — $\frac{3}{14}$, откуда отношения $AK : KA_1$ и $CP : PC_1$ равны $3 : 25$ и $27 : 1$ (в каком-то порядке).

8. Дан правильный 16-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 364.

Решение. Опишем окружность вокруг 16-угольника. Вписанный угол, равный 90° , опирается на диаметр, поэтому одна из диагоналей является диаметром окружности, а две другие вершины находятся по разные стороны от этого диаметра. Всего есть 8 диаметров; каждую из двух других вершин можно выбрать семью способами. Тогда получается $8 \cdot 7 \cdot 7 = 392$ четвёрок точек. Но при таком подсчёте прямоугольники (т.е. четырёхугольники, у которых обе диагонали являются диаметрами) посчитаны дважды. Прямоугольников выходит $C_8^2 = 28$ штук, и в итоге получаем $392 - 28 = 364$ варианта.

БИЛЕТ 6

1. Решите уравнение $\log_{(4^{x+4})}(x^4) + \log_{(2^{x+4})}((x+5)^2) = \frac{4}{x+4}$.

Ответ: $x = -1, x = \frac{-5 \pm \sqrt{41}}{2}$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{4}{2(x+4)} \log_2 |x| + \frac{2}{x+4} \log_2 |x+5| = \frac{4}{x+4} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 |x| + \log_2 |x+5| = 2, \\ x+4 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 |x^2 + 5x| = \log_2 4, \\ x \neq -4 \end{cases}$$

Уравнение $|x^2 + 5x| = 4$ эквивалентно совокупности двух уравнений $x^2 + 5x = -4$ и $x^2 + 5x = 4$, решая

которые, находим, что $x = -1, x = -4, x = \frac{-5 \pm \sqrt{41}}{2}$. Значение $x = -4$ не входит в ОДЗ.

2. Решите уравнение $\sqrt{38} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) = \sqrt{37 - \sin 3x}$.

Ответ: $x = \frac{5\pi}{2} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению $37 - \sin 3x = 38 \cos^2\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right)$ при условии $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) \geq 0$. С помощью формулы приведения, формулы понижения степени и формулы синуса тройного угла получаем:

$$37 - \sin 3x = 19 + 19 \cos\left(x + \frac{3\pi}{2}\right), 18 - 3 \sin x + 4 \sin^3 x = 19 \sin x, 2 \sin^3 x - 11 \sin x + 9 = 0.$$

Обозначая $\sin x = y$ ($|y| \leq 1$), получаем уравнение $2y^3 - 11y + 9 = 0$, одним из корней которого является $y = 1$. После деления на $(y - 1)$ остаётся уравнение $2y^2 + 2y - 9 = 0$. Его корни $\left(y = \frac{-1 \pm \sqrt{19}}{2}\right)$ по модулю больше единицы, следовательно, они не подходят.

Если $y = 1$, то $\sin x = 1, x = \frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Подставляя найденные x в неравенство $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) \geq 0$, получаем $\cos(\pi + \pi m) \geq 0$. Несложно видеть,

что подходят только нечётные значения m , т.е. $m = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$, откуда $x = \frac{5\pi}{2} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

3. Решите неравенство $\left(\frac{6|2x+1|}{4x^2+15}\right)^{-x+\sqrt{x^2-1}} > 1$.

Ответ: $x \in \left[1; \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Решение. Запишем неравенство в виде $\left(\frac{6|2x+1|}{4x^2+15}\right)^{-x+\sqrt{x^2-1}} > \left(\frac{6|2x+1|}{4x^2+15}\right)^0$. Обозначим $f(x) = \frac{6|2x+1|}{4x^2+15}$.

Несложно видеть, что $f(x)$ положительна при всех x из ОДЗ (значение $x = -\frac{1}{2}$ не входит в ОДЗ). Рас-

смотрим разность $f(x) - 1 = \frac{6|2x+1| - 4x^2 - 15}{4x^2 + 15}$.

При $x \geq -\frac{1}{2}$ она принимает вид $\frac{12x+6-4x^2-15}{4x^2+15} = \frac{-4x^2+12x-9}{4x^2+15} = \frac{-(2x-3)^2}{4x^2+15}$. Если $x < -\frac{1}{2}$, то получаем $\frac{-12x-6-4x^2-15}{4x^2+15} = \frac{-4x^2-12x-21}{4x^2+15} = \frac{-(2x+3)^2-12}{4x^2+15}$. Таким образом, рассматриваемая разность отрицательна при всех x , отличных от $\frac{3}{2}$. Отсюда следует, что $f(x) < 1$ при всех x , кроме $x = \frac{3}{2}$.

Подстановкой убеждаемся, что $x = \frac{3}{2}$ решением не является.

При всех остальных x неравенство равносильно каждому из следующих:

$$-x + \sqrt{x^2 - 1} < 0, \quad \sqrt{x^2 - 1} < x, \quad \begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 1 \geq 0, & x \geq 1. \\ x^2 - 1 < x^2, \end{cases}$$

Исключая значение $x = \frac{3}{2}$, получаем $x \in \left[1; \frac{3}{2}\right) \cup \left(\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

4. Число 52168 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 5216852168521685216852168521685216852168. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 219.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 6, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 2 и на 3. Для делимости на 2 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0, 2, 4, 6 или 8. Значит, полученное число будет делиться на 2, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 6 на 0, а цифры 5 и 8 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 2210222102221022210222102221022210222102$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 56. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две единицы, либо б) двойку и ноль. Количество способов вычеркнуть две единицы равно $C_8^2 = 28$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну двойку равно $C_8^1 \cdot C_{24}^1 = 8 \cdot 24 = 192$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $192 + 28 - 1 = 219$ способов.

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle ABC = 90^\circ$. Точка M – середина отрезка AB . Известно, что окружность радиуса 4 проходит через точки C и D и касается стороны AB в точке M , а $\cos \angle MDC = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Найдите длины отрезков CD и AB , а также площадь трапеции.

Ответ: $CD = 8$; $AB = \frac{32\sqrt{2}}{9}$; $S = \frac{128\sqrt{2}}{9}$.

Решение. Поскольку окружность касается AB , её центр O лежит на перпендикуляре к AB в точке M . С другой стороны, O лежит на серединном перпендикуляре к CD . Эти две прямые пересекаются в середине CD . Значит, O — середина CD , и CD — диаметр окружности, откуда $CD = 2R = 8$.

Обозначим $\angle BMC = \varphi$. Тогда дуга CM равна 2φ (теорема об угле между касательной и хордой), а $\angle CDM = \varphi$ (теорема о вписанном угле). Далее находим, что $\angle CMD = 90^\circ$ (опирается на диаметр), $\angle ADM = 90^\circ - \angle AMD = 90^\circ - (180^\circ - \angle CMD - \angle CMB) = \varphi$. Значит, прямоугольные треугольники DMA , DCM и MCB подобны.

Вычисляем основания и высоту трапеции: $CM = CD \sin \varphi = \frac{8}{3}$, $BC = BM \sin \varphi = \frac{8}{9}$,
 $BM = AM = CM \cos \varphi = \frac{16\sqrt{2}}{9}$, $AB = 2AM = \frac{32\sqrt{2}}{9}$, $AD = AM \operatorname{ctg} \varphi = \frac{64}{9}$. Тогда площадь трапеции S равна
 $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{8}{9} + \frac{64}{9} \right) \cdot \frac{32\sqrt{2}}{9} = \frac{128\sqrt{2}}{9}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (3x^2 + 3xy + 2y^2)(|x + y| - 8) \geq 0, \\ x(x - 4) + y(y - 2) = a? \end{cases}$$

Ответ: $a = 0; a = 7,5$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = 3x^2 + 3xy + 2y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = 9y^2 - 24y^2 = -15y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = 3x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} 3x^2 + 3xy + 2y^2 = 0, \\ |x + y| \geq 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x + y \geq 8, \\ x + y \leq -8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \geq 8 - x, \\ y \leq -8 - x. \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = 8 - x$ и выше неё, точки на прямой $y = -x - 8$ и ниже неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём к уравнению $x(x - 4) + y(y - 2) = a$. Преобразуем левую часть, выделяя полные квадраты, и получаем $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = a + 5$. При $a < -5$ это уравнение задаёт пустое множество, при $a = -5$ — точку $T(2; 1)$, а при $a > -5$ — окружность с центром в точке $T(2; 1)$ радиуса $\sqrt{a + 5}$.

Очевидно, при $a \leq -5$ система не имеет решений. При $a > -5$ единственное решение возможно в двух случаях: окружность проходит через точку $K(0; 0)$ или окружность касается прямой $y = 8 - x$. В первом случае радиус окружности должен быть равен длине отрезка TK , т.е. $\sqrt{a + 5} = \sqrt{5}$, откуда $a = 0$. Во втором случае радиус равен расстоянию от точки T до прямой $x + y - 8 = 0$, т.е. $\sqrt{a + 5} = \frac{|2 + 1 - 8|}{\sqrt{1 + 1}}$, откуда $a = 7,5$.

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $BN : NB_1$, если $CP : PC_1 = 3 : 25$.

Ответ: $AK : KA_1 = 27 : 1$, $BN : NB_1 = 3 : 4$ или $AK : KA_1 = 3 : 4$, $BN : NB_1 = 27 : 1$.

Решение. Пусть, для определённости, ABC — нижнее основание призмы. Пусть α касается нижнего и верхнего оснований цилиндра в точках X и X_1 соответственно. Из симметрии, XX_1 пересекает ось цилиндра. Обозначив через X' проекцию точки X на нижнее основание; тогда XX' — диаметр нижнего основания.

Пусть K' , N' , P' — проекции точек K , N , P на осевое сечение цилиндра, содержащее XX_1 (тогда они лежат на XX_1), а A' , B' , C' — проекции точек A , B , C на XX' . Поскольку A , B , C — проекции

точек K, N, P на нижнее основание, получаем, что A', B', C' также являются проекциями K, N, P (а также K', N', P') на XX' . Значит, $\frac{AK}{KA_1} = \frac{XK'}{K'X_1} = \frac{XA'}{A'X'}$ и, аналогично, $\frac{BN}{NB_1} = \frac{XB'}{B'X'}$ и $\frac{CP}{PC_1} = \frac{XC'}{C'X'}$.

Пусть теперь O – центр нижнего основания, и $\angle XOC = \varphi$. Без ограничения общности можно считать, что радиус нижнего основания равен 1. Тогда $XC' = 1 - \cos \varphi$. Поскольку $\angle AOC = \angle BOC = \frac{2\pi}{3}$, аналогично получаем, что длины отрезков XB' и XA' равны $1 - \cos\left(\varphi \pm \frac{2\pi}{3}\right)$.

Из условия получаем $XC' = 2 \cdot \frac{3}{3+25}$, значит, $\cos \varphi = \frac{11}{14}$. Тогда $\sin \varphi = \frac{5\sqrt{3}}{14}$, откуда

$$\cos\left(\varphi + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} - \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{11}{14} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{5\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{13}{14} \text{ и}$$

$$\cos\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} + \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{11}{14} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{5\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{7}.$$

Значит, один из отрезков XA' и XB' равен $\frac{27}{14}$, а другой – $\frac{6}{7}$, откуда отношения $AK : KA_1$ и $BN : NB_1$ равны $3:4$ и $27:1$ (в каком-то порядке).

8. Дан правильный 18-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 540.

Решение. Опишем окружность вокруг 18-угольника. Вписанный угол, равный 90° , опирается на диаметр, поэтому одна из диагоналей является диаметром окружности, а две другие вершины находятся по разные стороны от этого диаметра. Всего есть 9 диаметров; каждую из двух других вершин можно выбрать восемью способами. Тогда получается $9 \cdot 8 \cdot 8 = 576$ четвёрок точек. Но при таком подсчёте прямоугольники (т.е. четырёхугольники, у которых обе диагонали являются диаметрами) посчитаны дважды. Прямоугольников выходит $C_9^2 = 36$ штук, и в итоге получаем $576 - 36 = 540$ вариантов.

БИЛЕТ 7

1. Решите уравнение $\log_{(3^{x-3})}((x-4)^2) + \log_{(9^{x-3})}(x^4) = \frac{2}{x-3}$.

Ответ: $x=1, x=2 \pm \sqrt{7}$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{2}{x-3} \log_3|x-4| + \frac{4}{2(x-3)} \log_3|x| = \frac{2}{x-3} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_3|x-4| + \log_3|x| = 1, \\ x-3 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2|x^2-4x| = \log_3 3, \\ x \neq 3 \end{cases}$$

Уравнение $|x^2-4x|=3$ эквивалентно совокупности двух уравнений $x^2-4x=-3$ и $x^2-4x=3$, решая которые, находим, что $x=1, x=3, x=2 \pm \sqrt{7}$. Значение $x=3$ не входит в ОДЗ.

2. Решите уравнение $2\sqrt{6} \cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{23 + \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right)}$.

Ответ: $x = -\pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению $23 + \sin\left(3x - \frac{\pi}{2}\right) = 24 \cos^2\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right)$ при условии $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$. С помощью формул приведения, формул понижения степени и формулы косинуса тройного угла получаем:

$$23 - \cos 3x = 12 + 12 \cos(x + \pi), \quad 11 - 4 \cos^3 x + 3 \cos x = -12 \cos x, \quad 4 \cos^3 x - 15 \cos x - 11 = 0.$$

Обозначая $\cos x = y$ ($|y| \leq 1$), получаем уравнение $4y^3 - 15y - 11 = 0$, одним из корней которого является $y = -1$. После деления на $(y+1)$ остаётся уравнение $4y^2 - 4y - 11 = 0$. Его корни $\left(y = \frac{1 \pm 2\sqrt{3}}{2}\right)$ по модулю больше единицы, следовательно, они не подходят.

Если $y = -1$, то $\cos x = -1, x = \pi + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Подставляя найденные x в неравенство $\cos\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{2}\right) \geq 0$, получаем $\cos(\pi + \pi m) \geq 0$. Несложно видеть, что подходят только нечётные значения m , т.е. $m = 2k - 1, k \in \mathbb{Z}$, откуда $x = -\pi + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

3. Решите неравенство $\left(\frac{2|2x-3|}{x^2+10}\right)^{x+\sqrt{x^2-3}} > 1$.

Ответ: $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; -\sqrt{3}]$.

Решение. Запишем неравенство в виде $\left(\frac{2|2x-3|}{x^2+10}\right)^{x+\sqrt{x^2-3}} > \left(\frac{2|2x-3|}{x^2+10}\right)^0$. Обозначим $f(x) = \frac{2|2x-3|}{x^2+10}$.

Несложно видеть, что $f(x)$ положительна при всех x из ОДЗ (значение $x = \frac{3}{2}$ не входит в ОДЗ). Рассмотрим разность $f(x) - 1 = \frac{2|2x-3| - x^2 - 10}{x^2 + 10}$.

$$f(x) - 1 = \frac{2|2x-3| - x^2 - 10}{x^2 + 10}.$$

При $x \geq \frac{3}{2}$ она принимает вид $\frac{4x-6-x^2-10}{x^2+10} = \frac{-x^2+4x-16}{x^2+10} = \frac{-(x-2)^2-12}{x^2+10}$. Если $x < \frac{3}{2}$, то получаем $\frac{6-4x-x^2-10}{x^2+10} = \frac{-x^2-4x-4}{x^2+10} = \frac{-(x+2)^2}{x^2+10}$. Таким образом, рассматриваемая разность отрицательна при всех x , отличных от -2 . Отсюда следует, что $f(x) < 1$ при всех x , кроме $x = -2$.

Подстановкой убеждаемся, что $x = -2$ решением не является.

При всех остальных x неравенство равносильно каждому из следующих:

$$x + \sqrt{x^2 - 3} < 0, \sqrt{x^2 - 3} < -x, \begin{cases} -x > 0, \\ x^2 - 3 \geq 0, & x \leq -\sqrt{3}. \\ x^2 - 3 < x^2, \end{cases}$$

Исключая значение $x = -2$, получаем $x \in (-\infty; -2) \cup (-2; -\sqrt{3}]$.

4. Число 51746 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 51746517465174651746517465174651746517465174651746. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 219.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 6, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 2 и на 3. Для делимости на 2 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0, 2, 4, 6 или 8. Значит, полученное число будет делиться на 2, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 7 и 4 на 1, цифры 6 на 0 и цифры 5 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 2111021110211102111021110211102111021110$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 40. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две двойки, либо б) единицу и ноль. Количество способов вычеркнуть две двойки равно $C_8^2 = 28$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну единицу равно $C_8^1 \cdot C_{24}^1 = 8 \cdot 24 = 192$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $28 + 192 - 1 = 219$ способов.

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle ADC = 90^\circ$. Точка K – середина отрезка CD . Известно, что окружность радиуса 3 проходит через точки A и B и касается стороны CD в точке K , а $\sin \angle KAD = \frac{1}{3}$. Найдите длины отрезков AB и CD , а также площадь трапеции.

Ответ: $AB = 6, CD = \frac{8\sqrt{2}}{3}; S = 8\sqrt{2}$.

Решение. Поскольку окружность касается CD , её центр O лежит на перпендикуляре к CD в точке K . С другой стороны, O лежит на серединном перпендикуляре к AB . Эти две прямые пересекаются в середине AB . Значит, O – середина AB , и AB – диаметр окружности, откуда $AB = 2R = 10$.

Обозначим $\angle BKC = \varphi$. Тогда дуга BK равна 2φ (теорема об угле между касательной и хордой), а $\angle BAK = \varphi$ (теорема о вписанном угле). Далее находим, что $\angle BKA = 90^\circ$ (опирается на диаметр), $\angle DAK = 90^\circ - \angle DKA = 90^\circ - (180^\circ - \angle BKA - \angle BKC) = \varphi$. Значит, прямоугольные треугольники AKB , ADK и KCB подобны.

Вычисляем основания и высоту трапеции: $BK = AB \sin \varphi = 2, BC = BK \sin \varphi = \frac{2}{3}, DK = CK = BK \cos \varphi = \frac{4\sqrt{2}}{3}, CD = 2CK = \frac{8\sqrt{2}}{3}, AD = KD \operatorname{ctg} \varphi = \frac{16}{3}$. Тогда площадь трапеции S равна $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{16}{3} + \frac{2}{3} \right) \cdot \frac{8\sqrt{2}}{3} = 8\sqrt{2}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (x^2 - 4xy + 7y^2)(10 - |x - y|) \leq 0, \\ x(x - 2) + y(y + 6) = a? \end{cases}$$

Ответ: $a = 0; a = 8$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = x^2 - 4xy + 7y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = 16y^2 - 28y^2 = -12y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} x^2 - 4xy + 7y^2 = 0, \\ |x - y| \geq 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x - y \geq 10, \\ x - y \leq -10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \leq x - 10, \\ y \geq x + 10. \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = x + 10$ и выше неё, точки на прямой $y = x - 10$ и ниже неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём к уравнению $x(x - 2) + y(y + 6) = a$. Преобразуем левую часть, выделяя полные квадраты, и получаем $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = a + 10$. При $a < -10$ это уравнение задаёт пустое множество, при $a = -10$ — точку $T(1; -3)$, а при $a > -10$ — окружность с центром в точке $T(1; -3)$ радиуса $\sqrt{a + 10}$.

Очевидно, при $a \leq -10$ система не имеет решений. При $a > -10$ единственное решение возможно в двух случаях: окружность проходит через точку $K(0; 0)$ или окружность касается прямой $y = x - 10$. В первом случае радиус окружности должен быть равен длине отрезка TK , т.е. $\sqrt{a + 10} = \sqrt{10}$, откуда $a = 0$. Во втором случае радиус равен расстоянию от точки T до прямой $x - y - 10 = 0$, т.е.

$$\sqrt{a + 10} = \frac{|1 + 3 - 10|}{\sqrt{1 + 1}}, \text{ откуда } a = 8.$$

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $CP : PC_1$ и $BN : NB_1$, если $AK : KA_1 = 1 : 12$.

Ответ: $CP : PC_1 = 25 : 27$, $BN : NB_1 = 49 : 3$ или $CP : PC_1 = 49 : 3$, $BN : NB_1 = 25 : 27$.

Решение. Пусть, для определённости, ABC — нижнее основание призмы. Пусть α касается нижнего и верхнего оснований цилиндра в точках X и X_1 соответственно. Из симметрии, XX_1 пересекает ось цилиндра. Обозначив через X' проекцию точки X на нижнее основание; тогда XX' — диаметр нижнего основания.

Пусть K' , N' , P' — проекции точек K , N , P на осевое сечение цилиндра, содержащее XX_1 (тогда они лежат на XX_1), а A' , B' , C' — проекции точек A , B , C на XX' . Поскольку A , B , C — проекции точек K , N , P на нижнее основание, получаем, что A' , B' , C' также являются проекциями K , N , P (а также K' , N' , P') на XX' . Значит, $\frac{AK}{KA_1} = \frac{XK'}{K'X_1} = \frac{XA'}{A'X'}$ и, аналогично, $\frac{BN}{NB_1} = \frac{XB'}{B'X'}$ и $\frac{CP}{PC_1} = \frac{XC'}{C'X'}$.

Пусть теперь O — центр нижнего основания, и $\angle XOA = \varphi$. Без ограничения общности можно считать, что радиус нижнего основания равен 1. Тогда $XA' = 1 - \cos \varphi$. Поскольку $\angle AOB = \angle AOC = \frac{2\pi}{3}$, аналогично

получаем, что длины отрезков XB' и XC' равны $1 - \cos\left(\varphi \pm \frac{2\pi}{3}\right)$.

Из условия получаем $XA' = 2 \cdot \frac{1}{1 + 12}$, значит, $\cos \varphi = \frac{11}{13}$. Тогда $\sin \varphi = \frac{4\sqrt{3}}{13}$, откуда

$$\cos\left(\varphi + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} - \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{11}{13} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{4\sqrt{3}}{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{23}{26} \text{ и}$$

$$\cos\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} + \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{11}{13} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{4\sqrt{3}}{13} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{1}{26}.$$

Значит, один из отрезков XA' и XC' равен $\frac{49}{26}$, а другой – $\frac{25}{26}$, откуда отношения $BN : NB_1$ и $CP : PC_1$ равны $25 : 27$ и $49 : 3$ (в каком-то порядке).

8. Дан правильный 20-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 765.

Решение. Опишем окружность вокруг 20-угольника. Вписанный угол, равный 90° , опирается на диаметр, поэтому одна из диагоналей является диаметром окружности, а две другие вершины находятся по разные стороны от этого диаметра. Всего есть 10 диаметров; каждую из двух других вершин можно выбрать девятью способами. Тогда получается $10 \cdot 9 \cdot 9 = 810$ четвёрок точек. Но при таком подсчёте прямоугольники (т.е. четырёхугольники, у которых обе диагонали являются диаметрами) посчитаны дважды. Прямоугольников выходит $C_{10}^2 = 45$ штук, и в итоге получаем $810 - 45 = 765$ вариантов.

БИЛЕТ 8

1. Решите уравнение $\log_{(2^{x+1})}(x^2) + \log_{(4^{x+1})}((x+3)^4) = \frac{2}{x+1}$.

Ответ: $x = -2$, $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$.

Решение. Данное уравнение равносильно каждому из следующих:

$$\frac{2}{x+1} \log_2 |x| + \frac{4}{2(x+1)} \log_2 |x+3| = \frac{2}{x+1} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 |x| + \log_2 |x+3| = 2, \\ x+1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 |x^2 + 3x| = \log_2 2, \\ x \neq -1 \end{cases}$$

Уравнение $|x^2 + 3x| = 2$ эквивалентно совокупности двух уравнений $x^2 + 3x = -2$ и $x^2 + 3x = 2$, решая

которые, находим, что $x = -1$, $x = -2$, $x = \frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$. Значение $x = -1$ не входит в ОДЗ.

2. Решите уравнение $\sqrt{29 + \sin 3x} = \sqrt{30} \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$.

Ответ: $x = \frac{3\pi}{2} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

Решение. Данное уравнение равносильно уравнению $29 + \sin 3x = 30 \sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ при условии $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$. В левой части раскладываем синус тройного угла, а в правой части используем формулу понижения степени и формулу приведения, и получаем:

$$29 + \sin 3x = 15 - 15 \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right), 14 + 3 \sin x - 4 \sin^3 x = -15 \sin x, 2 \sin^3 x - 9 \sin x - 7 = 0.$$

Обозначая $\sin x = y$ ($|y| \leq 1$), получаем уравнение $2y^3 - 9y - 7 = 0$, одним из корней которого является $y = -1$. После деления на $(y + 1)$ остаётся уравнение $2y^2 - 2y - 7 = 0$. Его корни $\left(y = \frac{1 \pm \sqrt{15}}{2}\right)$ по модулю больше единицы, следовательно, они не подходят.

Если $y = -1$, то $\sin x = -1$, $x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi m, m \in \mathbb{Z}$.

Подставляя найденные x в неравенство $\sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \geq 0$, получаем $\sin\left(-\frac{\pi}{2} + \pi m\right) \geq 0$. Несложно видеть,

что подходят только нечётные значения m , т.е. $m = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$, откуда $x = \frac{3\pi}{2} + 4\pi k, k \in \mathbb{Z}$.

3. Решите неравенство $\left(\frac{4|x+1|}{x^2+8}\right)^{-x+\sqrt{x^2-2}} > 1$.

Ответ: $x \in [\sqrt{2}; 2) \cup (2; +\infty)$.

Решение. Запишем неравенство в виде $\left(\frac{4|x+1|}{x^2+8}\right)^{-x+\sqrt{x^2-2}} > \left(\frac{4|x+1|}{x^2+8}\right)^0$. Обозначим $f(x) = \frac{4|x+1|}{x^2+8}$. Не-

сложно видеть, что $f(x)$ положительна при всех x из ОДЗ (значение $x = -1$ не входит в ОДЗ). Рассмотрим

разность $f(x) - 1 = \frac{4|x+1| - x^2 - 8}{x^2 + 8}$.

При $x \geq -1$ она принимает вид $\frac{4x+4-x^2-8}{x^2+8} = \frac{-x^2+4x-4}{x^2+8} = \frac{-(x-2)^2}{x^2+8}$. Если $x < -1$, то получаем $\frac{-4x-4-x^2-8}{x^2+8} = \frac{-x^2-4x-12}{x^2+8} = \frac{-(x+2)^2-8}{x^2+8}$. Таким образом, рассматриваемая разность отрицательна при всех x , отличных от 2. Отсюда следует, что $f(x) < 1$ при всех x , кроме $x = 2$.

Подстановкой убеждаемся, что $x = 2$ решением не является.

При всех остальных x неравенство равносильно каждому из следующих:

$$-x + \sqrt{x^2 - 2} < 0, \quad \sqrt{x^2 - 2} < x, \quad \begin{cases} x > 0, \\ x^2 - 2 \geq 0, \\ x^2 - 2 < x^2, \end{cases} \quad x \geq \sqrt{2}.$$

Исключая значение $x = 2$, получаем $x \in [\sqrt{2}; 2) \cup (2; +\infty)$.

4. Число 96182 написали 8 раз подряд, при этом получилось 40-значное число 96182961829618296182961829618296182961829618296182. Из этого 40-значного числа требуется вычеркнуть две цифры так, чтобы полученное после вычёркивания 38-значное число делилось на 6. Сколькими способами это можно сделать?

Ответ: 247.

Решение. Для того, чтобы число делилось на 6, необходимо и достаточно, чтобы оно делилось на 2 и на 3. Для делимости на 2 нужно, чтобы последней цифрой числа была 0, 2, 4, 6 или 8. Значит, полученное число будет делиться на 2, если мы вычеркнем любые цифры, кроме двух последних. Перейдём к делимости на 3.

Если в числе заменить все цифры 9 и 6 на 0, а цифры 8 на 2, то остаток от деления числа на 3 не изменится (остаток от деления числа на 3 равен остатку от деления суммы цифр этого числа на 3). Таким образом, нужно узнать, сколькими способами можно вычеркнуть две цифры из числа $X = 001220012200122001220012200122001220012200122$ так, чтобы полученное число делилось на 3. Сумма цифр числа X равна 40. Чтобы после вычёркивания сумма цифр делилась на 3, мы можем вычеркнуть либо а) две двойки, либо б) единицу и ноль. Количество способов вычеркнуть две двойки равно $C_{16}^2 = 120$; количество способов вычеркнуть один ноль и одну единицу равно $C_{16}^1 \cdot C_8^1 = 16 \cdot 8 = 128$.

Две последние цифры вычёркивать нельзя, поэтому получаем $120 + 128 - 1 = 247$ способов.

5. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями BC и AD , причём $BC < AD$, $\angle BAD = 90^\circ$. Точка K — середина отрезка AB . Известно, что окружность радиуса 6 проходит через точки C и D и касается стороны AB в точке K , а $\cos \angle KCB = \frac{1}{3}$. Найдите длины отрезков CD и AB , а также площадь трапеции.

Ответ: $CD = 12$; $AB = \frac{16\sqrt{2}}{3}$; $S = 32\sqrt{2}$.

Решение. Поскольку окружность касается AB , её центр O лежит на перпендикуляре к AB в точке K . С другой стороны, O лежит на серединном перпендикуляре к CD . Эти две прямые пересекаются в середине CD . Значит, O — середина CD , и CD — диаметр окружности, откуда $CD = 2R = 12$.

Обозначим $\angle AKD = \varphi$. Тогда дуга KD равна 2φ (теорема об угле между касательной и хордой), а $\angle KCD = \varphi$ (теорема о вписанном угле). Далее находим, что $\angle CKD = 90^\circ$ (опирается на диаметр), $\angle BCK = 90^\circ - \angle KCB = 90^\circ - (180^\circ - \angle CKD - \angle AKD) = \varphi$. Значит, прямоугольные треугольники DKA , DCK и KCB подобны.

Вычисляем основания и высоту трапеции: $CK = CD \cos \varphi = 4$, $BC = CK \cos \varphi = \frac{4}{3}$, $BK = AK = CK \sin \varphi = \frac{8\sqrt{2}}{3}$, $AB = 2BK = \frac{16\sqrt{2}}{3}$, $AD = AK \operatorname{ctg} \varphi = \frac{32}{3}$. Тогда площадь трапеции S равна $\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3} + \frac{32}{3} \right) \cdot \frac{16\sqrt{2}}{3} = 32\sqrt{2}$.

6. При каких значениях параметра a существует единственная пара чисел $(x; y)$, удовлетворяющая системе

$$\begin{cases} (2x^2 - 5xy + 4y^2)(7 - |x + y|) \leq 0, \\ x(x - 6) + y(y + 4) = a? \end{cases}$$

Ответ: $a = 0; a = 5$.

Решение. Рассмотрим выражение $A(x; y) = 2x^2 - 5xy + 4y^2$ как квадратный трёхчлен относительно x . Его дискриминант равен $D = 25y^2 - 32y^2 = -7y^2$. При $y \neq 0$ дискриминант отрицателен, поэтому $A > 0$. Если $y = 0$, то $A = 2x^2$, т.е. $A > 0$ при $x \neq 0$ и $A = 0$ при $x = 0$. В итоге получаем, что выражение $A(x; y)$ обращается в ноль в точке $(0; 0)$ и положительно во всех остальных точках.

Следовательно, неравенство системы равносильно совокупности

$$\begin{cases} 2x^2 - 5xy + 4y^2 = 0, \\ |x + y| \geq 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ x + y \geq 7, \\ x + y \leq -7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y = 0, \\ y \geq -x + 7, \\ y \leq -x - 7. \end{cases}$$

Изобразим множество точек, удовлетворяющих этой совокупности, на координатной плоскости. Получаем все точки, лежащие на прямой $y = -x + 7$ и выше неё, точки на прямой $y = -x - 7$ и ниже неё, а также точку $(0; 0)$.

Перейдём к уравнению $x(x - 6) + y(y + 4) = a$. Преобразуем левую часть, выделяя полные квадраты, и получаем $(x - 3)^2 + (y + 2)^2 = a + 13$. При $a < -13$ это уравнение задаёт пустое множество, при $a = -13$ — точку $T(3; -2)$, а при $a > -13$ — окружность с центром в точке $T(3; -2)$ радиуса $\sqrt{a + 13}$.

Очевидно, при $a \leq -13$ система не имеет решений. При $a > -13$ единственное решение возможно в двух случаях: окружность проходит через точку $K(0; 0)$ или окружность касается прямой $y = -x + 7$. В первом случае радиус окружности должен быть равен длине отрезка TK , т.е. $\sqrt{a + 13} = \sqrt{13}$, откуда $a = 0$.

Во втором случае радиус равен расстоянию от точки T до прямой $x + y - 7 = 0$, т.е. $\sqrt{a + 13} = \frac{|3 - 2 - 7|}{\sqrt{1 + 1}}$, откуда $a = 5$.

7. Правильная треугольная призма $ABCA_1B_1C_1$ вписана в цилиндр (основания призмы вписаны в окружности оснований цилиндра). Плоскость α имеет ровно одну общую точку с каждым из оснований цилиндра и пересекает рёбра AA_1 , BB_1 и CC_1 в точках K , N , P соответственно. Найдите отношения $AK : KA_1$ и $BN : NB_1$, если $CP : PC_1 = 1 : 27$.

Ответ: $AK : KA_1 = 4 : 3$, $BN : NB_1 = 25 : 3$ или $AK : KA_1 = 25 : 3$, $BN : NB_1 = 4 : 3$.

Решение. Пусть, для определённости, ABC — нижнее основание призмы. Пусть α касается нижнего и верхнего оснований цилиндра в точках X и X_1 соответственно. Из симметрии, XX_1 пересекает ось цилиндра. Обозначив через X' проекцию точки X на нижнее основание; тогда XX' — диаметр нижнего основания.

Пусть K' , N' , P' — проекции точек K , N , P на осевое сечение цилиндра, содержащее XX_1 (тогда они лежат на XX_1), а A' , B' , C' — проекции точек A , B , C на XX' . Поскольку A , B , C — проекции точек K , N , P на нижнее основание, получаем, что A' , B' , C' также являются проекциями K , N , P (а также K' , N' , P') на XX' . Значит, $\frac{AK}{KA_1} = \frac{XK'}{K'X_1} = \frac{XA'}{A'X'}$ и, аналогично, $\frac{BN}{NB_1} = \frac{XB'}{B'X'}$ и $\frac{CP}{PC_1} = \frac{XC'}{C'X'}$.

Пусть теперь O — центр нижнего основания, и $\angle XOC = \varphi$. Без ограничения общности можно считать, что радиус нижнего основания равен 1. Тогда $XC' = 1 - \cos \varphi$. Поскольку $\angle AOC = \angle BOC = \frac{2\pi}{3}$, аналогично получаем, что длины отрезков XA' и XB' равны $1 - \cos\left(\varphi \pm \frac{2\pi}{3}\right)$.

Из условия получаем $XC' = 2 \cdot \frac{1}{1+27}$, значит, $\cos \varphi = \frac{13}{14}$. Тогда $\sin \varphi = \frac{3\sqrt{3}}{14}$, откуда

$$\cos\left(\varphi + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} - \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{13}{14} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{3\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{11}{14} \text{ и}$$

$$\cos\left(\varphi - \frac{2\pi}{3}\right) = \cos \varphi \cos \frac{2\pi}{3} + \sin \varphi \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{13}{14} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + \frac{3\sqrt{3}}{14} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{1}{7}.$$

Значит, один из отрезков XA' и XC' равен $\frac{25}{14}$, а другой — $\frac{8}{7}$, откуда отношения $AK : KA_1$ и $CP : PC_1$ равны $25 : 3$ и $4 : 3$ (в каком-то порядке).

8. Дан правильный 14-угольник. Найдите количество четвёрок его вершин, являющихся вершинами выпуклого четырёхугольника, в котором хотя бы один угол равен 90° . (Две четвёрки вершин, отличающиеся порядком вершин, считаются одинаковыми.)

Ответ: 231.

Решение. Опишем окружность вокруг 14-угольника. Вписанный угол, равный 90° , опирается на диаметр, поэтому одна из диагоналей является диаметром окружности, а две другие вершины находятся по разные стороны от этого диаметра. Всего есть 7 диаметров; каждую из двух других вершин можно выбрать шестью способами. Тогда получается $7 \cdot 6 \cdot 6 = 252$ четвёрки точек. Но при таком подсчёте прямоугольники (т.е. четырёхугольники, у которых обе диагонали являются диаметрами) посчитаны дважды. Прямоугольников выходит $C_7^2 = 21$ штук, и в итоге получаем $252 - 21 = 231$ вариант.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

За полностью верное решение ставится полный балл, указанный в скобках после номера задачи. Оценки за частичные продвижения приведены ниже.

Перед подачей апелляции внимательно изучите критерии оценивания (см. ниже) и решения. После рассмотрения работы оценка может быть изменена как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Верный ответ не гарантирует постановку полного балла за задачу.

Критерии оценивания. Математика 2013. Варианты 1 – 4.

За арифметическую ошибку, принципиально не влияющую на ход решения, снимать 1 очко.

1(4). Логарифмы приведены к одинаковому постоянному основанию.....+1 очко.
Уравнение сведено к кубическому.....+1 очко.
Решено кубическое уравнение.....+1 очко.
Сделан отбор корней.....+1 очко.
Указано неверное ОДЗ (не учтено, что подлогарифмическое выражение положительно) – **снять 1 очко.**

2(5). За неравносильное преобразование неравенства (например, домножение на знаменатель, не являющийся знакопостоянной функцией).....**0 очков за всю задачу.**
Указано, что если знаменатель правой части отрицателен, то решений нет.....+1 очко.

A. При решении домножением на знаменатели с обоснованием, что они положительные:
сведено к квадратному неравенству с модулем.....+1 очко,
решено полученное неравенство.....+3 очка,

– если разобран только один случай раскрытия модуля, то **1 очко вместо 3.**

B. При решении обобщённым методом интервалов:
найжены нули числителя.....+2 очка,

– если это сделано только при одном раскрытии модуля, то **0 очков вместо 2,**

не обоснована расстановка знаков при условии, что знаки расставлены верно – **снять 1 очко,**
знаки расставлены неверно – **не более 2 очков за всю задачу.**

Внимание! Правильный ответ мог быть получен в результате двойной ошибки (домножение обеих частей неравенства на знаменатель неизвестного знака, а затем возведение обеих частей в квадрат). За такое решение – **0 баллов.**

3(6). Уравнение сведено к однородному уравнению второй степени относительно $\sin x$ и $\cos x$
или к уравнению вида $a \cos 2x + b \sin 2x = c$ +2 очка,
решено полученное уравнение.....+2 очка,
верно сделан отбор корней.....+2 очка.
В решении отсутствует упоминание об отборе при условии, что получен верный ответ – **снять 1 очко.**

4(6). Указано, что для делимости на 5 нельзя вычёркивать две последние цифры.....+1 очко.
Верно выписаны пары цифр (или остатки от деления их на 3), которые можно вычеркнуть для делимости на 3.....+2 очка,
– если эти пары верно описаны (например: либо две цифры, дающие остаток 1 от деления на 3, либо одну цифру, делящуюся на 3 и одну, дающую остаток 2 от деления на 3), но допущена ошибка при перечислении пар.....+1 очко.

За правильный принцип подсчёта в случае вычёркивания двух одинаковых (различных) цифр.....
.....+1 очко за каждый из случаев.

Получен ответ на единицу больше, чем правильный – **снять 1 очко.**

Неполный перебор не добавляет очков!

5(7). Применена теорема о двух секущих.....+1 очко.
Доказано, что трапеция равнобокая.....+1 очко.
Доказано, что треугольник равнобедренный и вычислено отношение его сторон.....+1 очко.
Найдены стороны параллелограмма и его площадь.....+2 очка.
Найден радиус окружности.....+2 очка.

6(7). Изображено множество точек, удовлетворяющих первому неравенству.....+2 очка,
– если при этом потеряна точка $(0; 0)$, то **0 очков вместо 2.**

В зависимости от a изображено множество точек, удовлетворяющих второму неравенству.....+3 очка.
Найдены значения параметра.....+2 очка,
– если при этом нестрогое неравенство заменено на строгое (или наоборот), то **снять 1 очко.**

7(9). а) (2)

- б) (5) Доказано, что боковые рёбра пирамиды равны.....+1 очко,
доказано, что центр сферы лежит на высоте пирамиды.....+1 очко,
доказано, что высота проходит через середину гипотенузы.....+1 очко.
в) (2) Найдены катеты основания+1 очко.

8(6). Не учтён двойной подсчёт равнобедренных треугольников – *снять 2 очка.*

Критерии оценивания. Математика 2013. Варианты 5 – 8.

За арифметическую ошибку, принципиально не влияющую на ход решения, снимать 1 очко.

- 1(4). Логарифмы приведены к одинаковому постоянному основанию.....+1 очко.
Уравнение сведено к квадратному уравнению с модулем (с модулями).....+1 очко,
– если модули пропущены, то *очко не ставится*,
– если получено уравнение четвёртой степени и оно не решено, то *очков не добавлять*.

Решено полученное уравнение.....+1 очко.

Сделан отбор корней.....+1 очко.

– если модули были пропущены, то *очко не ставится*.

Потеря модулей – *не более 2 очков за всю задачу.*

2(5). Уравнение сведено к кубическому уравнению относительно $\sin x$ или $\cos x$ +2 очка,

– если допущена ошибка в тригонометрической формуле, в результате которой получено неверное кубическое уравнение, то *0 очков за всю задачу*;

– если в результате ошибки в формуле тригонометрии получено верное уравнение (например, ошибка в знаке в формуле приведения до возведения в квадрат), то *снять 3 очка от общей суммы*.

решено полученное уравнение.....+2 очка.

верно сделан отбор корней.....+1 очко.

Внимание! Корни найдены подбором (угаданы) и не доказано, что других корней нет – *0 очков за всю задачу.*

3(6). За неравносильное преобразование неравенства.....*0 очков за всю задачу.*

Доказано, что основание степени лежит в интервале $(0; 1)$ при всех допустимых x , кроме $x = x_0$ +3 очка.

В ответе не учтено, что $x \neq x_0$ *снять 1 очко.*

Если при решении обобщённым методом интервалов знаки расставлены верно, но обоснование их расстановки отсутствует, то *снять 1 очко.*

Если при решении обобщённым методом интервалов знаки расставлены неверно, то *не более 3 очков за всю задачу.*

4(6). Указано, что для делимости на 2 нельзя вычёркивать две последние цифры.....+1 очко.

Верно выписаны пары цифр (или остатки от деления их на 3), которые можно вычеркнуть для делимости на 3.....+2 очка,

– если эти пары верно описаны (*например*: либо две цифры, дающие остаток 1 от деления на 3, либо одну цифру, делящуюся на 3 и одну, дающую остаток 2 от деления на 3), но допущена ошибка при перечислении пар.....+1 очко.

За правильный принцип подсчёта в случае вычёркивания двух одинаковых (различных) цифр.....
.....+1 очко за каждый из случаев.

Получен результат на единицу больше, чем правильный.....*снять 1 очко.*

Неполный перебор не добавляет очков!

5(7). Доказано, что большая боковая сторона является диаметром окружности.....+3 очка.

Найдена длина требуемого отрезка, отличного от диаметра.....+1 очко.

Найдена площадь трапеции.....+1 очко.

Внимание! Если в решении использовано, что центр окружности лежит на одной из боковых сторон и этот факт не доказан, то *снять 3 очка.*

Внимание! В ряде работ делается неверный вывод, что $ABCD$ – прямоугольник.

6(7). Изображено множество точек, удовлетворяющих первому неравенству.....+3 очка,

– если при этом потеряна точка $(0; 0)$, то *1 очко вместо 3.*

В зависимости от a изображено множество точек, удовлетворяющих второму неравенству.....+1 очко.

Найдено значение $a = 0$ +1 очко,

Найдено другое значение параметра.....+2 очка.

В ответ включён также случай касания окружности со второй прямой.....*снять 2 очка.*

Внимание! Во многих работах в ответе было записано значение $a = 0$, но не было обосновано, что при этом a решение единственно. За это очков не ставилось.

7(9). Если указан лишь один из двух вариантов ответа, то *очки не снимать*.

8(6). Не учтён двойной подсчёт прямоугольников – *снять 2 очка*.